



알고 계십니까?...

이제 출산 첫날부터 아기를 **백일해 (whooping cough)**로 부터 보호할 수 있습니다.

- 연구 결과에 따르면 임신 중에 백일해 예방접종을 하여도 산모와 태아 모두에게 안전하고 효과적이라는 사실이 밝혀졌습니다.
- 임신 중에 예방접종을 실시하면 (28주차가 선호됨) 산모의 체내에 생성된 항체가 출생 전 태아에게 전이됩니다. 해당 항체는 출생 후 6 주 차에 실시되는 예방접종 시까지 아기를 보호해 줄 것입니다.
- 백일해는 심한 기침을 초래하는 박테리아성 질병으로 전염성이 매우 높습니다. 누구든지 감염될 수 있지만, 유아들에게 더 심한 증상을 유발시킬 수 있으며(치명적일 수도 있음), 예방접종을 할 수 없을 정도로 어린 영아에게 특히 위험합니다.
- 또한 아기와 접촉할 가족들도 백일해 예방접종을 미리 받아야 합니다. 태어날 아기의 형제, 자매들에 대해서는 예방접종 일정에 맞추어 접종을 완료하도록 해야 하며, 아기를 보살필 사람이나 가까운 친지들도 지난 10년 간 백일해 예방접종을 하지 않았다면 아기와 접촉하기 적어도 2주일 전에 백일해 예방접종을 받아야 합니다.
- 임신을 계획하고 있거나 이미 임신을 한 상태라면 일반의(GP)나 호주원주민 의료 서비스, 기타 의료 기관에 임신 중 필요한 예방접종에 관해 문의하시기 바랍니다.

백신	추천 사항
백일해	임신 3기 (28주차가 선호됨)의 임신부
독감	임신 기간과 상관 없이 접종할 수 있으며 독감 유행 기간에 임신 2기나 3기에 접어드는 임신부에게 특별히 접종을 권고함



Health

임신 중 예방접종이 얼마나 효과가 있는가?

임신 기간에 예방접종을 하지 않은 산모가 대형병원에서 출산한 영아들 중 매년 **50명**이 백일해에 걸리고, 그 중 **40명**은 입원을 해야 합니다.

병원에서 출산을 하는 모든 산모들이 예방접종을 한 상태였다면 연간 백일해에 걸리는 영아는 **4명**에 불과할 것입니다.

임신 중 예방접종을 하지 않았을 경우 백일해 발병 건수



임신 중 예방접종을 했을 경우 백일해 발병 건수



아기 출산 후

'예방접종일 저장 (Save the Date to Vaccinate)' 전화 앱을 다운로드 받으십시오.

'예방접종일 저장 (Save the Date to Vaccinate)' 전화 앱은 아기의 예방접종일을 저장하여 미리 알려주는 서비스를 제공합니다. '예방접종일 저장 (Save the Date to Vaccinate)' 웹사이트, www.immunisation.health.nsw.gov.au 에서도 다양한 비디오 자료를 비롯, 예방접종과 관련된 유용한 정보를 이용할 수 있습니다.



앱
다운로드...



Health

