

ការចាក់ថ្នាំសំរាប់ទារកដែលទើបនឹងកើត - ហេតុដូចម្តេចបានជាថ្នាំទាំងនេះជាការសំខាន់
Injections for newborn babies - why they're important

មាតាបិតាត្រូវដឹងអំពីការចាក់ថ្នាំសំរាប់ទារកដែលទើបនឹងកើត។ មួយគឺការចាក់ថ្នាំវីតាមីន K ពិសេសម្យ៉ាង ហៅ vitamin K សំរាប់ការពារនូវលក្ខណៈមួយដែលកម្រកើតមានឡើង តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហៅថា “ការចេញឈាមព្រោះខ្វះជាតិវីតាមីន K” (Vitamin K Deficiency Bleeding អក្សរកាត់ VKDB)។ ការចាក់ថ្នាំមួយទៀតគឺសំរាប់ការពារទល់នឹងជំងឺថ្លើម Hepatitis B ។ ទារកអាចទទួលបានការចាក់ថ្នាំទាំងនេះនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពេលដែលទើបនឹងកើតរួច។ ការចាក់ថ្នាំនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ អត់មានគិតថ្លៃឡើយ។

តើហេតុដូចម្តេចបានជាទារកត្រូវការវីតាមីន K ?

បើកាលណាខ្វះជាតិវីតាមីន K ទារកអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើត“បញ្ហាចេញឈាមព្រោះខ្វះជាតិវីតាមីន K (VKDB)”។ នេះអាចបណ្តាលឲ្យមានការចេញឈាមខ្លាំង ដែលអាចទាក់ទងដល់ខួរក្បាល។

តើទារកទាំងអស់ដែលទើបនឹងកើត ត្រូវការវីតាមីន K ឬ ?

ពិតហើយ។ ទារកដែលទើបនឹងកើត អាចមិនមានវីតាមីន K គ្រប់គ្រាន់ក្នុងសរីរាង្គកាយសំរាប់ការពារកុំឲ្យមាន“បញ្ហាចេញឈាមព្រោះខ្វះជាតិវីតាមីន K”។ ប៉ុន្តែកាលណាមានអាយុដល់៦ខែ តាមធម្មតាវាងកាយទារកបង្កើតវីតាមីននោះគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯង។

តើតាមធម្មតាគេឲ្យវីតាមីន K តាមការចាក់ថ្នាំឬ ?

គេអាចឲ្យតាមការចាក់ថ្នាំ ឬជាថ្នាំគ្រាប់លប។ ការចាក់ថ្នាំវាជាការងាយស្រួលជាង ពីព្រោះគេចាក់តែម្តង ហើយមានឥទ្ធិពលជាច្រើនខែ។

ទារកត្រូវការថ្នាំចាក់ប្រសិនបើ ៖

- ទារកនោះកើតមិនគ្រប់ខែ ឬឈឺ
- ម្តាយព្យាបាលសំរាប់ជំងឺឆ្កួតជ្រួក(Epilepsy), កកឈាម (Blood clots), ឬមានជំងឺរបេង។ (ត្រូវប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតឬធុបច្ចេកវិទ្យាដឹងបើកាលណាអ្នកប្រើថ្នាំណាមួយនោះ)។

លោកអ្នកអាចលេបវីតាមីន K បាន ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានឥទ្ធិពលបានដូចជាថ្នាំចាក់នោះទេ។ មានន័យថា ទារកនោះត្រូវលេបជាលើក ៖

- នៅពេលកើត
- ៣បួនថ្ងៃក្រោយពេលកើត
- នៅពេលអាយុបាន៤អាទិត្យ។

របៀបផ្សេងទៀតដែលអាចឆ្លងជម្ងឺ Hepatitis B មាន ៖

- បើឈាមរបស់អ្នកមានជម្ងឺនេះជួបប៉ះឈាមរបស់លោកអ្នក។ នេះរួមទាំង៖ ការប៉ះតាមរយៈដាច់រោតស្បែក, ការប៉ះតាមរយៈការប្រើម្ជុលឬគ្រឿងចាក់ដែលមានមេរោគនោះនៅពេលប្រើចាក់គ្រឿងញៀន, ការប៉ះតាមរយៈការប្រើគ្រឿងឬម្ជុលសំរាប់ចោះរាងកាយ ដូចជាការសាក់ខ្លួនជាដើម។
- តាមរយៈការសេពកាមជាមួយជនដែលមានមេរោគនេះ។

តើហេតុអ្វីបានជាត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការនៅពេលកើត ?

ការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ Hepatitis B ឲ្យទៅទារកនៅពេលកើតភ្លាមគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវ ដើម្បីធ្វើឱ្យអាយុ ថ្នាំបង្ការនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុត។ ទារកត្រូវការការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ Hepatitis B ៣ដងថែមទៀត - ម្តងនៅពេលកូនបានអាយុ២ខែ, ម្តងនៅពេលអាយុ៤ខែ និងម្តងទៀតនៅពេលវ័យ១២ខែ។ គេចាក់ថ្នាំ បង្ការនេះនៅពេលធ្វើការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្សេងៗទៀត។

តើកូនអ្នកត្រូវតែចាក់ថ្នាំបង្ការឬ ?

វាជាការសំរេចចិត្តរបស់លោកអ្នក ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលឲ្យខ្លាំងក្លាក្នុងចំណុចនេះ។

តើការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ Hepatitis B អាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដែរឬទេ ?

កម្រមានធ្វើទុក្ខអ្វីខ្លាំងណាស់។ ភាពធ្វើទុក្ខធម្មតាដែលច្រើនមាន ដូចជា ការឈឺកន្លែងចាក់ថ្នាំ គ្រុនក្តៅមធ្យម, និងការឈឺសន្លាក់ដៃជើង។ បើលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ គួរទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិត។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការពិបាកក្នុងការទូរស័ព្ទជាភាសាអង់គ្លេស សូមលោកអ្នកទាក់ទងទៅសេវាបកប្រែភាសា (TIS) តាមរយៈលេខ 13 1 450។

លោកអ្នកអាចយកព័ត៌មានផ្នែកសុខភាពបន្ថែមទៀតជាភាសាខ្មែរ ពីវិបសាយរបស់អង្គការ **Multicultural Communication** ដោយ: <http://mhcs.health.nsw.gov.au>

លេខទូរស័ព្ទទាំងនេះត្រឹមត្រូវនៅពេលបោះពុម្ពផ្សាយ ក៏ប៉ុន្តែអាចមិនមានការកែតម្រូវឲ្យទាន់កាលៈទេសៈ។ លោកអ្នកប្រហែលត្រូវមើលបញ្ជាក់លេខនៅក្នុង“សៀវភៅទូរស័ព្ទ”(Telephone Directory)។