

Инјекције за новорођенчад - зашто су оне важне Injections for newborn babies – why they're important

Родитељи треба да знају да постоје две веома важне инјекције за новорођенчад. Једна је специјални витамин (витамин К) који спречава веома редак, али врло опасан поремећај - крварење услед недостатка витамина К (назив поремећаја на енглеском је Vitamin K Deficiency Bleeding -VKDB). Другом инјекцијом се код новорођенчади ствара имунитет против обољења јетре - жутице типа Б. Бебе могу да приме ове инјекције у болници, одмах по рођењу. Инјекције у државним болницама су бесплатне.

Зашто је бебама потребан витамин К?

Без довољно витамина К новорођенчад су у опасности од крварења услед недостатка овог витамина. То може изазвати тешко крварење чак и на мозгу.

Да ли је свим бебама потребан витамин К?

Свакако. Новорођенчад можда немају довољно овог витамина у телу да би се спречило крварење услед недостатка витамина К. Али већ у шестом месецу само тело је способно да производи довољну количину овог витамина.

Да ли се витамин К увек даје путем инјекције?

Витамин се може убризгати путем инјекције, или орално. Инјекција је подеснија јер се ради о само једној дози која је довољна за више месеци.

Бебама је потребна инјекција у следећим околностима:

- ако су превремено рођене или су болесне
- ако су њихове мајке током трудноће узимале лекове против епилепсије, згрушавања крви или туберкулозе. (Обавезно обавестите лекара или бабицу ако узимате неке од ових лекова).

Витамин К се може дати детету и да прогута, али дејство неће бити тако дуготрајно као када се убризга инјекцијом. То значи да ће беби бити потребне три дозе:

- одмах по рођењу
- три или пет дана после рођења
- четири недеље после рођења

НАПОМЕНА:

Веома је важно да родитељи не забораве трећу дозу! Без ње, беба неће бити у потпуности заштићена.

Свака од поменутих доза се мора поновити и у случају да беба поврати.

Да ли узимање витамина К изазива и неке нежељене последице?

Витамин К се даје бебама још од 1980. и стручњаци у аустралијском здравству сматрају да је инјекција витамина К безбедна. Иако једна студија указује на везу између витамина К и појаве рака код деце, шест других студија не налазе никакву везу између витамина К и болести рака..

Да ли морам да дам сагласност за давање витамина К мом детету?

То је питање вашег избора. Међутим, лекари препоручују да све бебе треба да приме витамин К. Тиме су обухваћене и бебе које су болесне као и оне које се подвргавају некој операцији (укључујући и обрезивање). Родитељи који се одлуче против витамина К треба да пажљиво мотре да ли има било каквих симптома крварења услед недостатка витамина К. Ти симптоми укључују следеће:

- необјашњено крварење или модрице
- жутило коже и беоњача и **три недеље после рођења**.

Бебе које имају ове симптоме треба однети лекару (чак и ако су претходно примиле инјекцију са К витамином).

Зашто је бебама потребна инјекција против жутице типа Б?

Жутица типа Б је веома озбиљна болест изазвана вирусом који напада јетру. Неки људи који имају овај вирус немају никакве или само благе симптоме. Али око 25% лица погођених вирусом могу касније у животу да добију тешко обољење јетре, посебно ако су ову болест имали као деца. Вакцинација помаже да се то спречи.

Како се преноси жутица типа Б?

Овај вирус живи у телесним течностима (крви, пљувачки и семену). Бебе чије су мајке имале жутицу типа Б изложене су великом ризику да при рођењу буду инфициране овом болешћу.

Други начини на које се преноси жутица типа Б су следећи:

- Ако ваша крв дође у додир са крвљу заражене особе. То укључује контакт преко огреботина и посекотина на кожи, контакт са зараженим иглама и шприцевима при убризгавању дрога, контакт са зараженим инструментима, као што су справе за бушење ушију и других делова тела.
- Путем полног односа са зараженом особом.

Зашто се бебе вакцинишу одмах по рођењу?

Веома је важно започети са имунизацијом против жутице типа Б што је пре могуће, одмах по рођењу, како би се обезбедило што боље дејство вакцине. Бебама су потребне још три вакцине против жутице типа Б - после два месеца, затим после четири месеца, после шест или 12 месеци од рођења. Инјекције се дају са осталим, рутинским вакцинама за децу.

Да ли бебе морају да буду вакцинисане?

То је ваш избор, али здравствене власти изричито препоручују овај поступак.

Да ли инјекције против жутице типа Б могу да изазову проблеме?

Озбиљније нежељене последице су реткост. Најчешћи проблем је црвенило и болан оток око убода инјекције, блажа температура и болови у зглобовима. Ако сте забринути због било чега, обратите се лекару.

Ако вам је потребна помоћ да телефонирате на енглеском језику, назовите телефонску преводачку службу **Translating and Interpreting Service** на телефон 131 450.

Више информација о здрављу на српском језику можете наћи на мрежи за мултикултурну комуникацију **Multicultural Communication** на следећој адреси:

<http://mhcs.health.nsw.gov.au>