

## Pusat Kesehatan Seksual Sydney Sydney Sexual Health Centre



Pusat Kesehatan Seksual Sydney menyediakan jasa yang gratis, rahasia, dan lengkap yang dapat membantu anda menjaga kesehatan seksual anda. Jasa ini dapat mendukung kesehatan seksual anda dengan menyediakan tes skrining, vaksinasi dan pengelolaan infeksi menular seksual, termasuk HIV dan Hepatitis B, perawatan kesehatan seksual bagi perempuan maupun laki-laki, pendidikan, konseling bagi orang pribadi maupun pasangan, serta penukaran jarum suntik dan penyemprot. Jasa ini dapat menawarkan pilihan dari dokter, perawat, dan konselor baik laki-laki maupun perempuan, yang akan menghormati gaya hidup dan seksualitas anda.

### JAM BUKA:

Senin, Selasa, Kamis, Jumat:  
10.00 pagi sampai 6.00 sore  
Rabu: 2.00 siang sampai 6.00 sore

**KARTU MEDICARE TIDAK DIBUTUHKAN**

**Jasa Kesehatan Seksual NSW**

## Perawatan kesehatan seksual yang gratis dan rahasia

Albury	Tel: (02) 6058 1831
Bourke	Tel: (02) 6872 2145
Balranald	Tel: (03) 5021 7200
Broken Hill	Tel: (08) 8080 1556
Canterbury	Tel: (02) 9718 7655
Coffs Harbour	Tel: (02) 6659 1916
Dubbo	Tel: (02) 6885 1700
Forster	Tel: (02) 6555 6822
Gosford	Tel: (02) 4320 2114
Goulburn	Tel: (02) 4827 3470
Griffith	Tel: (02) 6962 3900
Katoomba	Tel: (02) 4780 6660
Kings Cross	Tel: (02) 9360 2766
Kogarah	Tel: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Tel: (02) 6829 1022
Lismore	Tel: (02) 6620 2980
Liverpool	Tel: (02) 9827 8022
Manly	Tel: (02) 9977 3288
Mt Druitt	Tel: (02) 9881 1733
Marrickville	Tel: (02) 9560 3057
Murwillumbah	Tel: (02) 6672 0277
Newcastle	Tel: (02) 4923 6909
Nowra	Tel: (02) 4423 9353
Orange	Tel: (02) 6361 9906
Parramatta	Tel: (02) 9843 3124
Penrith	Tel: (02) 4734 2507
Port Kembla	Tel: (02) 4276 2399
Richmond	Tel: (02) 4578 1622
St Leonards	Tel: (02) 9926 7414
Sydney City	Tel: (02) 9382 7440

Indonesian   
1999 - 2000   
[SSH-6135]

## Klamidia dan Gonore

(Chlamydia and Gonorrhoea)



Level 3, Nightingale Wing  
Sydney Hospital  
Macquarie Street, Sydney NSW 2000

**Telpon: (02) 9382 7440**

Telpon Gratis: 1800-451-624

(di luar Sydney)

TTY: 9221-6515

(Telpon Mesin Ketik untuk orang tuli)

Fax: (02) 9382-7475

Email: [sshc@sesahs.nsw.gov.au](mailto:sshc@sesahs.nsw.gov.au)

**Klamidia**

INDONESIAN

Klamidia adalah infeksi bakteri di alat kelamin atau dubur. Klamidia dapat menular kalau seseorang melakukan hubungan seks vaginal atau dubur dengan seseorang yang sudah mengalami infeksi tersebut tanpa memakai kondom. Gejala-gejala dapat muncul dalam waktu 2-14 hari setelah terinfeksi. Namun, seseorang bisa mengalami infeksi klamidia selama beberapa bulan ataupun beberapa tahun tanpa diketahuinya.

Seandainya seorang perempuan mengalami gejala-gejalanya, mungkin meliputi perubahan dalam pengeluaran dari vagina, perasaan sakit di perut bagian bawah, atau perdarahan yang tidak biasa. Orang laki-laki mungkin akan mengalami pengeluaran dari saluran kencing, perasaan sakit pada saat kencing, atau perasaan nyeri di saluran kencing.

Radang saluran kencing laki-laki yang disebabkan klamidia disebut *urethritis* yang tidak spesifik. Radang leher rahim perempuan disebut *cervicitis*.

Infeksi dubur biasanya ringan dan mungkin tidak diketahui, tetapi terkadang dapat menyebabkan perasaan sakit dubur atau pengeluaran dari dubur.

## **Gonore**

Gonore adalah infeksi bakteri di alat kelamin, dubur atau tenggorokan. Gonore dapat menular kalau seseorang melakukan hubungan seks vaginal, dubur atau mulut dengan seseorang yang sudah mengalami infeksi tersebut tanpa memakai kondom. Untuk laki-laki yang mengalami infeksi saluran kencing, gejala-gejalanya biasanya muncul dalam waktu 2-10 hari setelah terinfeksi, namun terkadang gejala-gejalanya hanya muncul setelah beberapa bulan. Laki-laki tersebut dapat mengalami pengeluaran dari saluran kencing, perasaan nyeri di saluran kencing, atau perasaan sakit pada saat kencing. Infeksi di leher rahim, dubur atau tenggorokan biasanya tanpa gejala. Namun, pengeluaran dari vagina atau dubur atau perasaan sakit panggul di perempuan mungkin disebabkan gonore.

## **Bagaimana caranya mengetes untuk gonore dan klamidia?**

Gonore dan klamidia dapat diketahui dengan sampel yang diseka dari saluran kencing, dubur atau tenggorokan. Penting agar anda tidak kencing selama paling tidaknya tiga jam sebelum menjalani tesnya.

## **Apa pengobatan untuk klamidia dan gonore?**

Baik klamidia maupun gonore mudah diobati dengan antibiotik yang sesuai. Mungkin anda akan membutuhkan antibiotik yang terdiri dari satu dosis tunggal atau satu seri antibiotik selama sepuluh hari.

## **Apa komplikasi dari infeksi tersebut?**

Kalau seorang perempuan yang mengalami infeksi klamidia atau gonore tidak diobati atau tidak diobati dengan baik, dia dapat mengalami penyakit radang panggul (PID). Penyakit tersebut adalah peradangan di organ reproduksi yang terletak di panggul. PID dapat menyebabkan kehamilan ektopik (kehamilan berkembang di saluran telur dari pada di rahim), infertilitas/kemandulan (kalau saluran telur dirusak oleh jaringan bekas luka), atau perasaan sakit panggul yang terus-menerus. Orang laki-laki juga dapat mengalami peradangan di alat kelamin bagian atas.

## **Apakah pasangan seks perlu diobati?**

Seseorang yang melakukan hubungan seks vaginal, mulut atau dubur dengan seseorang yang mengalami infeksi tersebut tanpa memakai kondom memiliki resiko tinggi terinfeksi.

***Agar menghindari komplikasi dari infeksi klamidia dan gonore yang bisa menjadi serius, semua pasangan seharusnya dites dan diobati***

***tanpa menghiraukan gejala-gejalanya ataupun hasil dari tes.***

## **Anda perlu tahu apa lagi mengenai infeksi klamidia dan gonore?**

- Kalau anda telah diberi satu seri antibiotik selama sepuluh hari, penting agar anda menghabiskan semuanya - gejala-gejalanya dapat membaik dalam waktu beberapa hari tetapi bakteri mungkin belum dibasmi semua.
- Apakah anda diberi resep obat yang terdiri dari satu dosis tunggal atau satu seri antibiotik selama sepuluh hari, sebaiknya menghindari hubungan seks selama paling tidaknya 10 hari karena infeksiya masih dapat menular. Kalau anda tidak dapat menghindari hubungan seks selama itu, seharusnya memakai kondom setiap kali.
- Antibiotik tertentu dapat menyebabkan pil kontrasepsi tidak berhasil. Perempuan yang telah diberi satu seri antibiotik selama sepuluh hari dan sedang memakai pil kontrasepsi seharusnya memakai kontrasepsi tambahan (misalnya kondom) selama memakai antibiotik tersebut dan selama tujuh hari sesudahnya.
- Kalau anda telah didiagnosa mengalami infeksi gonore, sebaiknya anda dites lagi tujuh hari setelah selesai pengobatan agar tahu kalau sudah sembuh.

Oktober 1999