

# បួសទ្រនិច និង ពងបែករលាក

## Boils and Impetigo

### តើបួសទ្រនិចជាអ្វី ?

បួសទ្រនិចជាជំងឺឆ្លងនៅលើស្បែកមនុស្ស ។ ជាទូទៅបណ្តាលមកពីបាក់តេរីឈ្មោះ ស្តាហ្វីលូកូក្រីស (Staphylococcus)។ បួសទ្រនិចមានលក្ខណៈទន់, ហើមឈឺ, ហើមពោរពេញដោយខ្លះៗ ជាទូទៅភាពពកទន់នេះបាត់ទៅវិញ នៅពេលបួសទ្រនិចនោះបែកធ្លាយខ្លះនិងទឹករងៃចេញអស់ ។

### តើពងបែករលាកជាអ្វី ?

ពងបែករលាកជាជំងឺឆ្លងនៅលើស្បែកបណ្តាលមកពីបាក់តេរី ស្តាហ្វីលូកូក្រីស (Staphylococcus) ឬ ស្ត្រេបតូកូក្រីស (Streptococcus) ។ រោគសញ្ញានៃពងបែករលាក អាចជាឯកន្ទុកតូចៗ ឬបន្ទុះដែលមានក្រុមពណ៌ក្រហម។ ជួនកាលគេហៅពងបែករលាកនេះ ថា “ពងបែកនៅសាលា (School sore)” ។

### តើគេព្យាបាលបួសទ្រនិច និងពងបែករលាក យ៉ាងដូចម្តេច ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញានៃបួសទ្រនិច ឬ ពងបែករលាក:

- ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីទទួលបានជំនួយក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺទាំងពីរនេះ
- បើសិនជាពងបែករលាកទាំងនោះតូចៗ ឬ តិចតួច ការប្រើក្រែមសំលាប់មេរោគនៅនឹងកន្លែង គួបផ្សំនិងការរុំដោយក្រណាត់សំពត់ក្តៅអាចជួយបាន។
- វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាឱ្យប្រើថ្នាំគ្រាប់អង្កីប៊ីយ៉ូទិកឬថ្នាំលាបលើស្បែក។ ការប្រើអង្កីប៊ីយ៉ូទិក ឱ្យគ្រប់កំរិតថ្ងៃមានសារសំខាន់ ។ បើអ្នកមិនធ្វើតាមទេ បែកអាចកើតឡើងវិញបាន។

### តើបួសទ្រនិច និងពងបែករលាក ឆ្លងរាលដាលយ៉ាងដូចម្តេច ?

បួសទ្រនិចនិងពងបែករលាក ឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តាមរយៈ ៖

- ការប៉ះ ឬ ព្រិចបួសទ្រនិច ឬ ពងបែករលាកនោះ
- ប្រើកន្លែងដែលមានប្រឡាក់មេរោគ, សំលៀកបំពាក់ឬ កំរាលពួកប្រើដោយមនុស្សដែលកើតបួសទ្រនិច ឬ ពងបែករលាក។
- ប្រើប្រាស់គ្រឿងសំអិតសំអាង (ឧទាហរណ៍ កន្ត្រៃកាត់ក្រចក, ចន្ទាស/តម្បៀត, ប្រដាប់ការពុកមាត់) ប្រើដោយអ្នកដែលកើតបួសទ្រនិច ឬ ពងបែករលាក។

### តើអ្នកអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃបួសទ្រនិច និងពងបែករលាក យ៉ាងដូចម្តេច?

**លាងដៃរបស់អ្នក**

ការលាងដៃជាមធ្យោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីរារាំងការឆ្លងរាលដាលនៃបួសទ្រូនិចនិងពងបែករលាក។ សូមលាងដៃទាំងមូលឲ្យបានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ (រួមទាំងចន្លោះម្រាមដៃនិងក្រោមក្រចក) ឲ្យបានហ្មត់ចត់ជាមួយសាប៊ូ និងទឹកម៉ាស៊ីនឲ្យបាន ១០ - ១៥ វិនាទី ។ លាងឲ្យបានល្អ និង ជូតឲ្យស្ងួត

(ដោយក្រដាសអនាម័យបើសិនអ្នកមាន) ។ លាងដៃរបស់អ្នក ៖

- មុននឹងក្រោយពីប៉ះកាន់ ឬ លាបរុំកន្លែងដែលក្លាយ ឬ របួស
- ក្រោយចេញពីបង្គន់
- ក្រោយញឹកសំបោរ
- មុនរៀបចំ ឬ បរិភោគអាហារ
- មុនកាន់ទារកទើបកើត
- ក្រោយប៉ះ ឬ កាន់សំលៀកបំពាក់ ឬ កំរាលពួក ឬ ស្រោមខ្នើយមិនទាន់បោកគក់
- ក្រោយកាន់សត្វពាហនៈ ឬ លាមកវា

**រុំបួសទ្រូនិច និង ពងបែករលាក**

- រុំឬគ្របបួសទ្រូនិចនិងពងបែករលាក ដោយក្រណាត់មិនជ្រាបទឹកនៅពេលថ្ងៃ
- ក្មេងដែលមានចេញពងបែករលាក មិនគួរទៅសាលារៀន ឬ ទារកគ្មានទេរហូតដល់ក្រោយពេលដែលពួកគេបាន ទទួលការព្យាបាលពេញមួយថ្ងៃ

**មិនត្រូវប្រើប្រាស់រួមគ្នានូវ:**

- កន្លែង, សំលៀកបំពាក់ ឬកំរាលពួកប្រឡាក់ឡើយ។ បើសិនអ្នកដេករួមគ្រឿងជាមួយនរណាម្នាក់ត្រូវរុំពងបែក ឬ ដីប្លាស្ទិកមួយយប់តែម្តង ។
- គ្រឿងសំភារៈសំរិតសំរាងមួយចំនួន មានដូចជា : កន្ត្រៃកាត់ក្រចក, ចន្ទាស/តម្បៀត, ប្រដាប់កោរ និង ប្រាស់ដុសធ្មេញ ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក, មណ្ឌលសុខភាព សហគមន៍ ឬ វេជ្ជបណ្ឌិត ។

**ព័ត៌មានបន្ថែម- Public Health Units in NSW**

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរសុខភាពសាធារណៈតាមតំបន់ ឬមណ្ឌលសុខភាពក្នុងសហគមន៍របស់លោកអ្នក។ សូមមើល នៅត្រង់កន្លែង 'NSW Government' នៅផ្នែកខាងមុខនៃសៀវភៅ White Pages។

**Metropolitan Areas**

Central Sydney	9515 3180
South Eastern Sydney	9382 8333
Northern Sydney	9477 9400
South Western Sydney	9828 5944
Western Sydney	9840 3603
Wentworth	4734 2022

**Rural Areas**

Central Coast	4349 4845
Mid North Coast	6588 2750

Mid Western	6339 5548
Hunter	4924 6477
Illawarra	4255 2200
New England	6766 2288
Northern Rivers	6620 7500
Macquarie	6841 2216
Southern	4827 3428
Greater Murray	6021 4799
Far West	(08) 8080 1499

**NSW Department of Health**

73 Miller Street  
North Sydney NSW 2059  
Tel. (02) 9391 9000  
Fax. (02) 9391 9101  
TTY. (02) 9391 9900

NSW Health website  
[www.health.nsw.gov.au](http://www.health.nsw.gov.au)