

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່

ໂຮກແຊລໂມເນໂລສິສ

ໂຮກ ແຊລໂມເນໂລສິສເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ
ການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ
ແຊລໂມເນລາ. ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ,
ການຕິດເຊື້ອ ແຊໂມເນໂລສິສສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກກິນອາຫານທີ່ເຊື້ອ
ໂຮກຫຼືບາງເທື່ອກໍ່ຜ່ານການຕິດຕໍ່ໃກ້ຊິດ
ກັບຄົນອື່ນທີ່ມີເຊື້ອໂຮກນີ້.

ສະບັບປັບປຸງແກ້ໄຂ: 14 ມະກະຣາ 2008

ໂຮກແຊລໂມເນໂລສິສ (Salmonellosis) ແມ່ນຫຍັງ?

Salmonellosis ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຕິດເຊື້ອໂຮກຈາກແບັກທີເຣັຍຊຶ່ງເອີ້ນວ່າແຊລໂມເນລາ (Salmonella). ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ການຕິດເຊື້ອ ຈາກ Salmonella ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກກິນອາຫານທີ່ມີເຊື້ອໂຮກຫຼືບາງເທື່ອກໍ່ຜ່ານການຕິດຕໍ່ໃກ້ຊິດ ກັບ ຄົນອື່ນທີ່ມີເຊື້ອໂຮກນີ້.

ໂຮກນີ້ມີອາການຫຍັງແດ່?

ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຮກ ຈາກ Salmonella ສ່ວນຫຼາຍຈະເຈັບຫົວ, ເປັນໄຂ້, ເຈັບຈຸກໃນຊ່ອງທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ, ປຸ້ນທ້ອງ ແລະ ຮາກ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ຕາມປົກກະຕິ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນພາຍໃນ 6-72 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຕິດເຊື້ອແລ້ວ. ອາການເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນຢູ່ປະມານ 4-7 ມື້, ບາງເທື່ອກໍ່ອາດເປັນດົນກວ່ານັ້ນ.

ໂຮກນີ້ແຜ່ຜ່າຍຢ່າງໃດ?

Salmonella ສ່ວນຫຼາຍຈະແຜ່ຜ່າຍໄປຫາຄົນ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າກິນອາຫານເນື້ອສັດທີ່ມີພິດເຊື້ອໂຮກ ແລະ ທີ່ທຸງຕົ້ມບໍ່ສຸກຄັກ (ນັ້ນກໍ່ຄື ຊີ້ນ, ສັດປີກ, ໄຂ່ ແລະ ຜລິຕັພັນອາຫານຈາກໄຂ່).

ແຜ່ຜ່າຍໂດຍ 'cross-contamination' ເກີດຂຶ້ນເມື່ອອາຫານຊຶ່ງພ້ອມທີ່ຈະກິນນັ້ນມີພິດເຊື້ອ Salmonella ຢູ່ແລ້ວ: ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອເຮົາເອົາມິດທີ່ມີເຊື້ອໂຮກມາປາດອາຫານ ທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ທຸງຕົ້ມຕື່ມອີກ ຫຼື ອາຫານຖືກຈັບບາຍດ້ວຍມືຂອງຜູ້ປຸງອາຫານ ທີ່ມີເຊື້ອໂຮກນີ້ຕິດຢູ່.

Salmonella ສາມາດແຜ່ຜ່າຍ ຈາກຄົນຫາຄົນ ໂດຍຜ່ານມືຂອງຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອໂຮກນີ້ຢູ່. ນອກນັ້ນ ມັນຍັງສາມາດ ແຜ່ຜ່າຍຈາກ ສັດມາຫາຄົນໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ໃຜແດ່ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຮກນີ້?

ທຸກໆຄົນສາມາດຕິດເຊື້ອ salmonellosis ໄດ້. ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ແລະຄົນທີ່ພູມຕ້ານທານຕ່ຳ, ແມ່ນພວກທີ່ມີແນວໂນ້ມ ວ່າ ຈະເຈັບປ່ວຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກໂຮກນີ້.

ຈະປ້ອງກັນໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ການປຸງແຕ່ງອາຫານ

ການທຸງຕົ້ມອາຫານຈົນສຸກດີຈະຂ້າເຊື້ອໂຮກ *Salmonella* ໄດ້. ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການກິນອາຫານດິບຫຼືສຸກງຽດິບໆ ຮວມມີ ຊີ້ນ, ສັດປີກ, ຫຼື ໄຂ່. ສັດປີກແລະຊີ້ນ - ເຊັ່ນ ແຮມເບີເກີ, ໃສ໌ອີວ ແລະ ຊີ້ນກ້ອນອົບ - ນັ້ນບໍ່ຄວນ ກິນຖ້າຫາກວ່າທາງໃນມັນເປັນສີແດງໆຢູ່

ການຈັບບາຍອາຫານ

ເນື່ອງຈາກວ່າ *Salmonella* ສາມາດຕິດຢູ່ມືຂອງຄົນເຮົາ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ເຮົາຕ້ອງລ້າງມື ໃຫ້ສະອາດຖີ່ຖ້ວນຫຼັງຈາກ ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳແລະກ່ອນລົງມືປຸງແຕ່ງອາຫານ. ຄວນລ້າງມືດ້ວຍສະບູແລະ ນ້ຳຢ່າງນ້ອຍ 10 ວິນາທີ, ໄລອອກ, ແລະ ເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງດີ. ເມື່ອລ້າງມື ຄວນໃສ່ໃຈເປັນພິເສດຢູ່ຕາມເລັບມື ແລະ ລະຫວ່າງນິ້ວມື.

ຜູ້ທີ່ຈັບບາຍອາຫານ ທີ່ມີເຊື້ອຢູ່ໃນໂຕສາມາດກະຈາຍເຊື້ອໂຮກ *Salmonella* ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ຈັບບາຍຫຼື ເສີບອາຫານ ຈົນກວ່າອາການຖອກທ້ອງໄດ້ຢຸດລົງແລະການກວດວິຈິຍໄດ້ສະແດງ ວ່າບໍ່ມີເຊື້ອ *Salmonella* ໃນອາຈົມແລ້ວ.

ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ

ການເກັບຮັກສາອາຫານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງວິທີສາມາດເຮັດໃຫ້ ເຊື້ອ *Salmonella* ຂຍາຍເຕີບໂຕໄດ້. ອາຫານປະເພດແຊ່ເຢັນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຕໍ່ກວ່າຫ້າອົງສາເຊລຊຽສ. ອາຫານຮ້ອນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຮ້ອນກວ່າ 60 ອົງສາ. ອາຫານທີ່ນຳມາອຸ່ນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຮ້ອນໂດຍໄວຈົນກວ່າທຸກໆສ່ວນຂອງອາຫານສຸກຈົນອອກຄວັນ.

ຖ້າຈະເອົາອາຫານແຊ່ແຂງອອກມາເຮັດໃຫ້ອ່ອນຕ້ອງເຮັດໂດຍປະໄວໃນຕູ້ເຢັນຫຼືເຕົາໄມໂຄຣເວຟ. ຍິ່ງທ່ານປະອາຫານ ໄວ້ຢູ່ ໃນຫ້ອງອຸນຫະພູມທັມມະດາ ດົນເທົ່າໃດ ເຊື້ອໂຮກ *Salmonella* ກໍຍິ່ງສາມາດ ຂຍາຍຕົວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ອາຫານເປື້ອຍ້ອນເຊື້ອໂຮກ

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ອາຫານເປື້ອຍ້ອນເຊື້ອໂຮກ:

- ໃຫ້ເກັບຮັກສາອາຫານດິບ (ເຊັ່ນຊີ້ນ) ໄວ້ໃນກັບທີ່ອັດໄວ້ຢ່າງດີຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມຂອງຕູ້ເຢັນຫຼືຢູ່ຊ່ອງນ້ຳແຂງ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ ນ້ຳຊີ້ນຢອດຫຼືເຮັຍລົງໄປໃສ່ອາຫານຢ່າງອື່ນຊຶ່ງພ້ອມທີ່ຈະກິນໄດ້ໂລດ.

ໃຫ້ທ່ຳແລະປົກປັດອາຫານ ທຸກຢ່າງໃນຕູ້ເຢັນ ແລະ ຕູ້ຊ່ອງນ້ຳແຂງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນ ຕິດເຊື້ອໂຮກ.

- ໃຫ້ລ້າງມືທັນທີຫຼັງຈາກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຫຼືຈັບອາຫານດິບ ແລະ ກ່ອນຈັບບາຍອາຫານສຸກຫຼືອາຫານທີ່ ພ້ອມຈະກິນໄດ້ໂລດ.
- ໃຫ້ໃຊ້ຊຽງ, ພາຖາດ, ບ່ວງສ້ອມແລະຖ້ວຍ ທີ່ສະອາດບໍ່ປະປົນກັນເມື່ອໃສ່ອາຫານດິບແລະອາຫານສຸກ. ຖ້າທ່ານມີຊຽງແຕ່ພຽງອັນດຽວໃຫ້ລ້າງຊຽງນັ້ນໃຫ້ສະອາດເປັນຢ່າງດີດ້ວຍນ້ຳສະບູກ່ອນນຳມາໃຊ້ໃໝ່ອີກ.
- ໃຫ້ລ້າງຂີ້ດິນທີ່ຕິດຜັກແລະໝາກໄມ້ລຶດອອກໃຫ້ໝົດກ່ອນນຳມາປຸງແຕ່ງຫຼືນຳມາກິນ.
- ເມື່ອເຊັດຖ້ວຍບ່ວງໃຫ້ໃຊ້ຜ້າສະອາດຜືນຕ່າງກັນກັບຜືນທີ່ນຳມາໃຊ້ເຊັດມືຫຼືເຊັດໜ້າໂຕະ; ໃຫ້ຊັກຜ້າທີ່ ໃຊ້ເຊັດຖ້ວຍບ່ວງ ຢ່າງສມຳສະເໝີ.

ຈະກວດຫາໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ເພື່ອຈະກວດຫາໂຮກນີ້, ທ່ານໝໍປະຈຳຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຫຼື ທາງໂຮງໝໍທ້ອງຖິ່ນຈະສົ່ງຕົວຢ່າງອາຈົມໄປ ໃຫ້ຫ້ອງທົດລອງກວດຫາ ເຊື້ອ Salmonella.

ຈະປິ່ນປົວໂຮກນີ້ຢ່າງໃດ?

ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະເຊົາໄປເອງຫຼັງຈາກພັກຜ່ອນແລະດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ. ບາງຄົນອາດຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ. ບາງເທື່ອ ແພດອາດໃຫ້ກິນຢາປະຕິຊີວະນະ (antibiotics) ສຳລັບກໍຣະນີທີ່ເປັນແບບແຊກຊ້ອນ.

ຜແນກສາທາຣະນະສຸກມີທ່າທີຢ່າງໃດຕໍ່ໂຮກນີ້?

ຫ້ອງທົດລອງຕ້ອງໄດ້ລາຍງານກໍຣະນີຂອງການຕິດເຊື້ອ Salmonella ໃຫ້ຜແນກສາທາຣະນະສຸກ ຫ້ອງຖິ່ນຊາບ. ຜແນກສາທາຣະນະສຸກຫ້ອງຖິ່ນຈະຕິດຕາມເບິ່ງກໍຣະນີທີ່ເປັນກ້ອນເປັນກຸ່ມ ແລະ ສືບຫາສາເຫດທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງໃຫ້ເກີດການຕິດຕໍ່. ຖ້າວ່າການ ຕິດເຊື້ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເກີດ ຈາກອາຫານຊົມໃດຊົມນຶ່ງ, ທາງການຄວບຄຸມການບໍຣິໂພກແຫ່ງຮັດ ນຊວ ຈະທຳການຄົ້ນຄວ້າ ສະພາບແວດລ້ອມແລະທາງວິທີຄວບຄຸມ. ສະຖິຕິທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈາກກໍຣະນີຂອງເຊື້ອໂຮກໄດ້ນຳມາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍ ໃນການຫາ ວິທີ ປ້ອງກັນ.

ທາງການຄວບຄຸມການບໍຣິໂພກແຫ່ງຮັດ ນຊວ salmonellosis ແລະ ການຕິດເຊື້ອທີ່ເກີດຈາກອາຫານ ເບື້ອຢ່າງອື່ນ.

ຮາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ ກະຮຸນາຕິດຕໍ່ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ຜແນກສາທາຣະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສູນອະນາໄມຊຸມຊົນ - ໃຫ້ເບິ່ງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຮູບບານປະຈຳຣັດ *NSW Government* ທາງໜ້າຂອງສມຸດ ໂທຣະສັບ (White Pages).

ເຂດໃນຕົວເມືອງ	ສະຖານທີ່	ເລກໂທຣະສັບ	ເຂດຊົນນະບົດ	ສະຖານທີ່	ເລກໂທຣະສັບ
Northern Sydney/Central Coast	Hornsby	02 9477 9400	Greater Southern	Goulburn	02 4824 1837
	Gosford	02 4349 4845		Albury	02 6080 8900
South Eastern Sydney/Illawarra	Randwick	02 9382 8333	Greater Western	Broken Hill	08 8080 1499
	Wollongong	02 4221 6700		Dubbo	02 6841 5569
Sydney South West	Camperdown	02 9515 9420		Bathurst	02 6339 5601
Sydney West	Penrith	02 4734 2022	Hunter/New England	Newcastle	02 4924 6477
	Parramatta	02 9840 3603		Tamworth	02 6767 8630
Justice Health Service	Matraville	02 9311 2707	North Coast	Port Macquarie	02 6588 2750
NSW Department of Health	Nth Sydney	02 9391 9000		Lismore	02 6620 7500
NSW Health: www.health.nsw.gov.au					