


悉尼性健康中心



悉尼性健康中心提供免费, 保密和全面性的服务, 以便帮助你掌管你的性方面的健康. 本服务帮助你维持性方面的健康的方法是提供性感染的检验, 疫苗接种和处理, 包括人体免疫力缺乏病毒 (简称 HIV), 乙型肝炎 (HEPATITIS B), 女士和男士性健康方面的医疗服务, 教育, 给予个别人士和夫妻的辅导, 及注射和针筒的交换. 本服务让你选择见男或女的医生, 护士和辅导员, 他们都会尊重你的生活方式和性行为.

Internet:

www.sesahs.nsw.gov.au/sydhosp/SSHHC.htm

无需出示医疗卡

中心开放时间:

星期一, 星期二, 星期四, 星期五

上午 10 时至下午 6 时

星期三下午 2 时至 6 时

电话: (02) 9382 7440

免费电话: 1800 451624

星期一至星期五上午 9 时至下午 5:30 时

新南威尔士州性保健 免费和保密的性健康医疗服务机构

| | |
|-----------------|--------------------|
| Albury | Ph: (02) 6058 1840 |
| Armidale | Ph: (02) 6776 4738 |
| Bourke | Ph: (02) 6872 2145 |
| Broken Hill | Ph: (08) 8080 1556 |
| Canberra | Ph: (02) 6244 2184 |
| Coffs Harbour | Ph: (02) 6656 7865 |
| Dareton | Ph: (03) 5021 7200 |
| Dubbo | Ph: (02) 6885 1700 |
| Forster | Ph: (02) 6555 6822 |
| Gosford | Ph: (02) 4320 2114 |
| Goulburn | Ph: (02) 4827 3913 |
| Griffith | Ph: (02) 6966 9900 |
| Katoomba | Ph: (02) 4784 6560 |
| Kings Cross | Ph: (02) 9360 2766 |
| Kogarah | Ph: (02) 9350 2742 |
| Lightning Ridge | Ph: (02) 6829 1022 |
| Lismore | Ph: (02) 6620 2980 |
| Liverpool | Ph: (02) 9827 8022 |
| Manly | Ph: (02) 9977 3288 |
| Marrickville | Ph: (02) 9560 3057 |
| Mt Druitt | Ph: (02) 9881 1733 |
| Newcastle | Ph: (02) 4923 6909 |
| Nowra | Ph: (02) 4423 9353 |
| Orange | Ph: (02) 6392 8600 |
| Parramatta | Ph: (02) 9843 3124 |
| Penrith | Ph: (02) 4734 2507 |
| Port Kembla | Ph: (02) 4276 2399 |
| Queanbeyan | Ph: (02) 6298 9233 |
| Richmond | Ph: (02) 4578 1622 |
| St Leonards | Ph: (02) 9926 7414 |
| Sydney City | Ph: (02) 9382 7440 |
| Tamworth | Ph: (02) 6766 3095 |
| Taree | Ph: (02) 6592 9421 |
| Wagga Wagga | Ph: (02) 6938 6492 |

want to know
more about

生殖器疣

GENITAL
WARTS



SYDNEY
SEXUAL
HEALTH
CENTRE

什么是生殖器疣病毒感染?

生殖器疣是由一种疣病毒引起的. 有超过七十种不同类型的疣病毒影响身体的不同部位.

疣病毒是最常见的性传播感染之一, 很多人携带病毒但并不知道.

据估计, 大多数性生活活跃的人群都会获得疣病毒感染, 但只有少数受感染的人发展成为疣.

如何知道患有生殖器疣病毒感染?

疣病毒感染可能以下列方式出现:

- **肉眼可见的疣**可以在生殖器或肛门附近的任何一处发现.
- **隐性感染** - 肉眼看不到, 但在显微镜下能看到变化, 显示有病毒存在(通常在宫颈涂片检查或活组织检查时).
- **潜伏性感染** - 病毒只能在用于研究用途的实验室技术时检测出来.

人如何受到感染?

生殖器疣通过直接接触另一人皮肤上的疣病毒感染区域而传播. 病毒通常通过性接触传播, 在和患有感染的人性接触后 3 周至 12 个月出现, 或者永不出现. 也有认为, 隐性感染是通过这种方式感染的, 但是目前还不完全清楚.

有固定性关系, 但一直未使用避孕套的人可以和他们的性伴侣或性保健人员进行商讨, 是否有必要开始使用避孕套.

性伴侣是否需要治疗?

如果出现了无法解释的肿块, 建议性伴侣去看医生或护士, 进行检查.

治疗方法是什么?

目前还没有治愈方法或疫苗, 但是有治疗方法. 治疗能去除疣或受感染的细胞, 但不一定能去除病毒.

疣可以通过使用生殖器疣涂剂或乳膏, 冷冻法, 电疗(灼热)或镭射方法去除. 治疗有时需要数次, 并且在任何一种治疗后, 都有可能复发. 医生或护士将会讨论最适合你的治疗方法.

生殖器疣是否会致癌?

有些类型的生殖器疣病毒与子宫颈, 外阴, 阴茎或肛门的不正常细胞改变有关系. 但是, 在这些病毒中, 只有少数和癌症有关. 这种关系和其它一些因素一起起作用, 其中一个可能是吸烟. 肉眼可见的疣较低可能引起导致癌症的细胞改变. 和不正常改变有关系的疣病毒通常引起隐性感染.

你还需要知道什么?

- 病毒广泛存在于生殖器或肛门周围, 因此, 避孕套可能不能完全阻止性接触中病毒的传播. 但是, 避孕套会帮助阻止病毒的传播.
- 定期的性伴侣可能需要进行一次检查

以确定是否感染了疣. 如果你不肯定如何和性伴侣讨论这件事, 你应和性保健门诊的心理顾问, 护士, 医生或你的家庭医生讨论此事.

- 如果你正接受可见疣的治疗, 应保持患处清洁和干燥, 可用盐水彻底清洗并干燥——每日一次即可.
- 减少或停止吸烟.
- 女性应确保定期进行宫颈涂片检查. 医生或护士将讨论进行下一次宫颈涂片检查的时间.
- 和新的性伴侣或临时性伴侣性接触时使用避孕套.