


悉尼性健康中心



悉尼性健康中心提供免费, 保密和全面性的服务, 以便帮助你掌管你的性方面的健康. 本服务帮助你维持性方面的健康的方法是提供性感染的检验, 疫苗接种和处理, 包括人体免疫力缺乏病毒 (简称 HIV), 乙型肝炎 (HEPATITIS B), 女士和男士性健康方面的医疗服务, 教育, 给予个别人士和夫妻的辅导, 及注射和针筒的交换. 本服务让你选择见男或女的医生, 护士和辅导员, 他们都会尊重你的生活方式和性行为.

无需出示医疗卡

中心开放时间:

星期一, 星期二, 星期四, 星期五

上午 10 时至下午 6 时

星期三下午 2 时至 6 时

电话: (02) 9382 7440

免费电话: 1800 451624

星期一至星期五上午 9 时至下午 5:30 时

Internet:

www.sesahs.nsw.gov.au/sydhosp/SSHC.asp

新南威尔士州性保健 免费和保密的性健康医疗服务机构

| | |
|-----------------|--------------------|
| Albury | Ph: (02) 6058 1840 |
| Armidale | Ph: (02) 6776 4738 |
| Bourke | Ph: (02) 6872 2145 |
| Broken Hill | Ph: (08) 8080 1556 |
| Canberra | Ph: (02) 6244 2184 |
| Coffs Harbour | Ph: (02) 6656 7865 |
| Dareton | Ph: (03) 5021 7200 |
| Dubbo | Ph: (02) 6885 1700 |
| Forster | Ph: (02) 6555 1800 |
| Gosford | Ph: (02) 4320 2114 |
| Goulburn | Ph: (02) 4827 3913 |
| Griffith | Ph: (02) 6966 9900 |
| Katoomba | Ph: (02) 4784 6560 |
| Kings Cross | Ph: (02) 9360 2766 |
| Kogarah | Ph: (02) 9350 2742 |
| Lightning Ridge | Ph: (02) 6829 9900 |
| Lismore | Ph: (02) 6620 2980 |
| Liverpool | Ph: (02) 9827 8022 |
| Manly | Ph: (02) 9977 3288 |
| Marrickville | Ph: (02) 9560 3057 |
| Mt Druitt | Ph: (02) 9881 1733 |
| Newcastle | Ph: (02) 4923 6909 |
| Nowra | Ph: (02) 4423 9353 |
| Orange | Ph: (02) 6392 8600 |
| Parramatta | Ph: (02) 9843 3124 |
| Penrith | Ph: (02) 4734 2507 |
| Port Kembla | Ph: (02) 4276 2399 |
| Queanbeyan | Ph: (02) 6298 9233 |
| Richmond | Ph: (02) 4578 1622 |
| St Leonards | Ph: (02) 9926 7414 |
| Sydney City | Ph: (02) 9382 7440 |
| Tamworth | Ph: (02) 6766 3095 |
| Taree | Ph: (02) 6592 9421 |
| Wagga Wagga | Ph: (02) 6938 6492 |



什么是淋病?

淋病是一种发生在生殖器, 肛门或咽喉部的细菌感染.

人如何受到感染?

淋菌是由于不带避孕套而与患有感染的人进行阴道, 肛门或口腔性交受到感染的.

如何知道患有淋病?

在男性, 尿道感染的症状通常出现在感染后 2-10 天, 尽管有时症状需几个月才出现. 症状可能包括尿道口流出的分泌物, 刺激症状或排尿时疼痛. 宫颈, 肛门或咽喉部的感染通常没有症状, 但是, 女性可能会出现阴道或肛门的分泌物或盆腔疼痛.

如何检测淋病?

淋病可通过从尿道, 宫颈, 肛门或咽喉部采集拭子进行检测, 得以诊断.

治疗方法是什么?

通过使用正确的抗生素, 淋病很容易被治愈.

性伴侣是否需要治疗?

未使用避孕套而进行阴道, 口腔或肛门性交的性伴侣受感染的危险性很高. 为了防止可能发生的严重并发症, 性伴侣应进行检测, **不论症状或检测结果如何都应进行治疗.** 避免任何性交(口腔, 肛门或阴道性交), 直到完全治愈, 否则你可能会被再次感染.

性健康门诊的工作人员能为那些有治疗需要的人提供保密的帮助.

淋菌感染有哪些并发症?

如果淋病未经治疗, 女性可导致盆腔炎 (PID). 这时盆腔内的生殖器官受到感染.

盆腔炎可引起异位妊娠(妊娠发生在输卵管而不是子宫内), 不孕(当输卵管被瘢痕组织损害)或慢性盆腔疼痛. 同样, 如果未经充分治疗, 男性会发展为上尿道感染. 这会引引起在检测中出现疼痛.

关于淋病, 你还需要知道什么?

- 完成治疗后 7 天, 你需要进行复查检测.
- 治疗后 7 天内, 应避免性交(包括口腔, 肛门和阴道性交), 否则, 你可能仍具有传染性或者再次被感染.
- 如果这段时间不能避免性生活, 你应每次都使用避孕套, 包括口腔性交时.

如何正确使用避孕套?



- 选择一个适合你的品牌的避孕套.
- 不要用牙咬开包装. 不要用指甲撕破避孕套.
- 查看使用日期.



- 挤压住避孕套的末端并套在勃起的阴茎上.
- 如果没有进行过包皮切割手术, 在戴避孕套之前拉开包皮.
- 将避孕套完全戴到阴茎的根部.



- 经常使用水性润滑剂.
- 不要使用按摩油或凡士林.
- 在性交过程中, 经常检查避孕套是否保持在原位.



- 性交结束后, 在阴茎仍勃起的情况下取下避孕套.
- 紧握避孕套的根部以避免精液流出.
- 一个避孕套只能使用一次.