


## 시드니 성건강 센터



시드니 성건강 센터는 비공개적이고 무료이며 여러분의 성건강 관리에 도움이 되는 포괄적 서비스를 제공합니다. 본 서비스는 예비검사, 예방접종, HIV 와 B 형 간염을 비롯한 성병 관리, 남녀 성건강 관리, 교육, 개인 및 커플 상담, 주사기 및 주사바늘 교환 등을 통해 여러분의 성건강에 도움을 드립니다. 본 서비스는 여러분의 라이프스타일과 성적 특질을 존중하는 남녀 의사/간호사/카운셀러로 구성되어 있습니다.

메디케어 카드가 필요없음

진료시간:

월요일, 화요일, 목요일, 금요일 10am - 6pm

수요일 2pm - 6pm

전화: (02) 9382 7440

인터넷:

[www.sesahs.nsw.gov.au/sydhosp/SSHC.asp](http://www.sesahs.nsw.gov.au/sydhosp/SSHC.asp)

## NSW 성건강 서비스 무료 & 비공개 성건강 관리

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Albury          | Ph: (02) 6058 1840 |
| Armidale        | Ph: (02) 6776 4738 |
| Bourke          | Ph: (02) 6872 2145 |
| Broken Hill     | Ph: (08) 8080 1556 |
| Canberra        | Ph: (02) 6244 2184 |
| Coffs Harbour   | Ph: (02) 6656 7865 |
| Dareton         | Ph: (03) 5021 7200 |
| Dubbo           | Ph: (02) 6885 1700 |
| Forster         | Ph: (02) 6555 1800 |
| Gosford         | Ph: (02) 4320 2114 |
| Goulburn        | Ph: (02) 4827 3913 |
| Griffith        | Ph: (02) 6966 9900 |
| Katoomba        | Ph: (02) 4784 6560 |
| Kings Cross     | Ph: (02) 9360 2766 |
| Kogarah         | Ph: (02) 9350 2742 |
| Lightning Ridge | Ph: (02) 68299900  |
| Lismore         | Ph: (02) 6620 2980 |
| Liverpool       | Ph: (02) 9827 8022 |
| Manly           | Ph: (02) 9977 3288 |
| Marrickville    | Ph: (02) 9560 3057 |
| Mt Druitt       | Ph: (02) 9881 1733 |
| Newcastle       | Ph: (02) 4923 6909 |
| Nowra           | Ph: (02) 4423 9353 |
| Orange          | Ph: (02) 6392 8600 |
| Parramatta      | Ph: (02) 9843 3124 |
| Penrith         | Ph: (02) 4734 2507 |
| Port Kembla     | Ph: (02) 4276 2399 |
| Queanbeyan      | Ph: (02) 6298 9233 |
| Richmond        | Ph: (02) 4578 1622 |
| St Leonards     | Ph: (02) 9926 7414 |
| Sydney City     | Ph: (02) 9382 7440 |
| Tamworth        | Ph: (02) 6766 3095 |
| Taree           | Ph: (02) 6592 9421 |
| Wagga Wagga     | Ph: (02) 6938 6492 |



### 임질이란 무엇인가?

임질은 음부, 항문, 또는 인후의 세균성 감염증입니다.

### 전염 경로는 어떻게 되나?

임질은 감염증이 있는 사람과 콘돔을 사용하지 않고 가진 질섹스, 항문섹스, 또는 오럴섹스를 통해 전염됩니다.

### 임질의 증상은?

요도(음경의 내부)에 감염증이 있는 남성의 경우에는 증상이 나타날 때까지 수 개월씩 걸리는 경우도 있으나 일반적으로는 감염후 2-10 일 내에 요도 감염 증상이 나타납니다. 그런 경우에는 요도 분비물, 요도 염증, 또는 소변시 통증이 증상으로 나타날 수 있습니다. 자궁경부, 항문, 인후의 감염증은 일반적으로 증상을 일으키지 않습니다. 그러나 임질균으로 인해 질/항문의 분비물이나 골반통이 생기는 경우도 있습니다.

### 임질의 검사 방법은?

임질은 요도, 자궁경부, 항문, 또는 인후에서 채취한 면봉검사로 진단할 수도 있고 소변검사로 진단할 수도 있습니다.

### 치료법은 어떻게 되나?

임질은 정확한 항생제를 사용하면 쉽게 완치됩니다.

### 섹스파트너도 치료를 받아야 하나?

콘돔을 사용하지 않고 질섹스, 항문섹스, 또는 오럴섹스를 한 섹스 파트너는 감염되었을 가능성이 높습니다. 잠재적으로 심각한 임질 합병증을 예방하려면 모든 파트너들이 검사를 받아야 하며 증상이나 검사 결과에 관계없이 치료를 받아야 합니다. 감염되었을 가능성이 있는 파트너와 성교를 하면 재감염될 수도 있으므로 그 파트너가 완치되기 전에는 성교를 삼가야 합니다.

감염 용의자들에게 치료를 받아야 한다는 사실을 알려주는 일은 성건강 진료소의 직원이 비공개적으로 보조해 드릴 수 있습니다.

### 임질의 합병증에는 어떤 것들이 있나?

여성의 경우 임질을 적절히 치료하지 않으면 골반내 염증성 질환(PID)으로 진전될 가능성이 있습니다. 이것은 골반 내에 있는 생식 기관에 염증이 생기는 경우입니다.

PID 는 자궁외 임신 (수정란이 자궁에서 발달하지 않고 나팔관에서 발달함), 불임증 (나팔관이 반흔조직에 의해 손상되는 경우), 또는 만성 골반통을 일으킬 수 있습니다. 마찬가지로, 남성의 경우에도 임질을 적절히 치료하지 않으면 생식기 상부에 염증이 생길 수 있습니다. 그렇게 되면 고환에 통증이 생길 수 있습니다.

### 임질에 관해 그 외에 또 알아두어야 할 것은?


- 치료가 완료된 후 7 일 뒤에 완치 확인 검사를 해야 합니다.
- 완치 확인 검사에서 임질이 완치되었다는 결과가 나오기 전에는 성교(오럴, 항문, 질)를 삼가야 합니다. 그렇지 않으면 임질을 계속 전염시키거나 재감염될 수도 있습니다.

이 기간 동안 성교를 삼가지 못할 경우에는 반드시 매번 콘돔을 사용해야 합니다 (오럴섹스 시에도)

### 콘돔을 바르게 사용하는 방법

편안하게 맞는 브랜드를 선택합니다. 포장을 뜯을 때 치아를 사용하지 않도록 합니다. 콘돔을 손톱으로 찢는 일이 없도록 주의합니다. "사용 유효" 날짜를 확인합니다.

콘돔의 끝부분을 잡고 누른 후 발기한 음경 위에 씹니다. 포경수술을 하지 않은 경우에는 포피를 위로 잡아당기고 씹니다. 콘돔을 음경의 밑부분까지 완전히 씹니다.



Open Carefully...



Squeeze the tip.



Unroll it fully.



Hold base... withdraw erect.

반드시 수성 윤활제를 사용합니다. 기름이나 바셀린을 사용하면 안됩니다. 섹스 도중 콘돔이 빠지지 않았는지 확인합니다.

끝난 후에는 음경이 여전히 발기된 상태에서 뺍니다. 뺄 때는 콘돔이 같이 나오고 내용물이 흘러나오지 않도록 콘돔의 밑부분을 잡고 뺍니다. 콘돔은 일회용입니다.

Korean/Gonorrhoea/March2003