

悉尼性健康中心



悉尼性健康中心提供免费, 保密和全面性的服务, 以便帮助你掌管你的性方面的健康. 本服务帮助你维持性方面的健康的方法是提供性感染的检验, 疫苗接种和处理, 包括人体免疫力缺乏病毒 (简称HIV), 乙型肝炎 (HEPATITIS B), 女士和男士性健康方面的医疗服务, 教育, 给予个别人士和夫妻的辅导, 及注射和针筒的交换. 本服务让你选择见男或女的医生, 护士和辅导员, 他们都会尊重你的生活方式和性行为.

无需出示医疗卡

中心开放时间:

星期一, 星期二, 星期四和星期五:

上午10时至下午6时

星期三下午2时至 6 时

电话: (02) 9382 7440

免费电话: 1800 451 624 (在悉尼以外地区)

Internet:

www.sesahs.nsw.gov.au/sydhosp/SSHC.htm

新南威尔士洲性保健 免费和保密的性保健方面的医疗服务

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

want to know
more about

传染性
软疣

MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM



SYDNEY
SEXUAL
HEALTH
CENTRE
SSHHC

什么是传染性软疣?

传染性软疣是一种皮肤的病毒性感染. 它呈现出中间凹陷的, 小的坚实团块, 呈白色或具有蜡样光泽. 在儿童, 传染性软疣通常感染面部及手臂. 在成人, 传染性软疣主要出现在生殖器周围, 但也可能感染身体其他部位. 因为外观相似, 传染性软疣有时被误诊为疣或者丘疹.

人如何受到感染 ?

传染性软疣通过亲密的身体接触(皮肤到皮肤)传播. 你不需要通过性行为就可以受到感染.

如何检测传染性软疣?

由于传染性软疣外观特征非常明显, 医生或性健康门诊通过检查即可诊断.

传染性软疣有并发症吗?

传染性软疣的并发症非常少见. 免疫系统受到抑制的人(如HIV)可能会出现广泛的且难

以治疗的传染性软疣.


治疗方法是什么?

传染性软疣可通过‘冷冻法’去除. 治疗可能有轻度的不适. 即使不经治疗, 传染性软疣最终也会自动消除. 但这可能需要两周到两年时间, 而且, 若不治疗可能会传染给其他人.

性伴侣需要治疗吗?

若性伴侣出现任何难以解释的团块, 建议最好去看医生或护士, 进行检查.

如何正确使用避孕套



Open Carefully...

选择一个适合你的品牌的避孕套.
不要用牙咬开包装.
不要用指甲撕破避孕套.
查看使用日期.



Squeeze the tip.

挤压住避孕套的末端并套在勃起的阴茎上.
如果没有进行过包皮切割手术, 在戴避孕套之前拉开包皮.
将避孕套完全戴到阴茎的根部.



剂. 或凡Unroll it fully.

经常使用水性润滑剂.
不要使用按摩油.
在性交过程中, 经常检查避孕套是否保持在原位.



套. 避免Hold base... withdraw erect.

性交结束后, 在阴茎仍勃起的情况下取下避孕套.
紧握避孕套的根部以精液流

一个避孕套只能使用一次.