

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກີ

ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກີປ້ອງກັນເດັກຈາກພະຍາດທີ່ ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຊຸມຊົນ ຊຶ່ງສືບຕໍ່ເກີດມີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຈາກພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ພວກເດັກນ້ອຍຍິ່ງເຈັບປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄປໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.

ສະພາການຄົ້ນຄວ້າ ດ້ານອະນາມັຍແລະການແພດ ແຫ່ງຊາດ ແນະນຳໃຫ້ມີແຜນການ ການສັກຢາ ແຫ່ງຊາດ ສຳລັບເດັກທຸກໆຄົນ. ທ່ານຄວນໂອ້ລົມ ເຮືອງຂໍ້ແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ກັບນາຍໝໍ ຫຼື ຄລິນິກໃນ ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ **ແລະ/ຫຼື ເບິ່ງເວັບໄຊ ສຸຂພາບ ຂອງຣັດ NSW www.health.nsw.gov.au ເພື່ອເບິ່ງ ແຜນການ ການສັກຢາແຫ່ງຊາດ ອັນປັດຈຸບັນ.**

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກີໄວ້ສຳລັບປ້ອງກັນເດັກຈາກ ໂຣກຄໍຕິບ ໂຣກບາດທະຍັກ ໂຣກໂອໂກ ໂຣກໂປລີໂອ ໂຣກຫັດ ໂຣກ ໝາກເບີດ ໂຣກຮູແບລລາ ໂຣກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ປະເພດ b (Hib), ໂຣກຕັບ ອັກເສບ ປະເພດ B, ໂຣກເຫຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບ ປະເພດ C, ໂຣກປອດບວມ ແລະ ໂຣກໝາກສຸກ ໝາກໃສ. ຢາສັກເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ໃຫ້ຢູ່ທີ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນ ຂອງທ່ານ ຕາມຫ້ອງການເທສບານບາງແຫ່ງ ໂຮງໝໍ ເດັກ ສູນອະນາມັຍຊຸມຊົນ ແລະ ສູນບໍລິການ ການແພດ ອາບໍຣິຈີໂນລ.

ເດັກບາງຄົນອາດຈະມີອາການເປັນໄຂ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ/ ຫຼືຮອຍແດງ ໃຄ່ແລະບວມຢູ່ບ່ອນຮອຍສັກຢາ. ກະຣຸນາຕິດຕໍ່ນາຍໝໍ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກວ່າ ອາການໄຂ້ສູງກວ່າ 39ອົງສາ ຫຼື ຖ້າທ່ານກັງວົນກັບ ສະພາບການຂອງລູກທ່ານ.

ເດັກທາຣິກທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບແມດິແຄຣ ກໍ ແມ່ນໄດ້ລົງທະບຽນກັບ ກອງທະບຽນ ສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຣກຄົນອອ້ສເຕຣລຽນ ວັຍເດັກ (ACIR). ຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກແຕ່ລະຄັ້ງ ນາຍໝໍ ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຫຼື ຄລິນິກຈະແຈ້ງທາງ ACIR ໃຫ້ຊາບເຖິງຂັ້ນສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງເດັກ.

ACIR ຈະສົ່ງບັນທຶກປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ໄປໃຫ້ທ່ານໃນທັນທີທີ່ລູກທ່ານໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຈົນຄົບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ຕອນເວລາອາຍຸ 4ປີ. ທ່ານຈະຖືກຂໍໃຫ້ເອົາບັນທຶກອັນນີ້ໄປຫາໂຮງຮຽນໃນ ມື້ທີ່ລູກທ່ານຈົດຊື່ເຂົ້າຮຽນ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບບັນທຶກນີ້ ຫຼື ມີບັນຫາກັບບັນທຶກນີ້ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ACIR ຕາມເບີ 1800 653 809.