

SSWAHS
Информации за мајките за прихранување
Mother's Information Sheet
For Complementary Feeding

Сојузниот Совет за здравствено И медицинско истражување на Австралија И Државниот правилник за доење на НЈВ наведуваат дека рутинското користење на дополнителна храна од каков И да е вид треба да се исклучи кај новороденчињата кои се родени после полна бременост И се дојат, заради следниве причини:

- Вештачкото млеко (Формула) влијае врз заштитата од инфекција што мајчиното млеко е во состојба да му ја обезбеди на бебето
- Доењето работи на принципот на понуда И побарувачка. Ако оброците на доење се пропуштат И се заменат со вештачко млеко, дојките создаваат помалку млеко
- Кога млекото нема да се ослободи од дојките тие почнуваат да болат И престануваат да создаваат млеко
- Вашето бебе може да биде алергично на протеинот во вештачкото млеко
- Доењето по потреба ја намалува можноста бебето да добие рана жолтица
- Истражувањата покажуваат дека постои значителна врска помеѓу давањето дополнителна храна/прихранување во болница И намалената веројатност да се продолжи со доењето после отпуштањето од болница

Сакаме да нагласиме дека нашиот совет е:

- Редовно да се измолзувате за да го одржувате создавањето на млеко И да спречите да дојде до воспалување
- Да користите измолзено млеко ако е можно за да ја намалите шансата да се развие алергија на протеинот во кравјото млеко

(Адаптирано од НХ&МРЦ Правилникот за хранење новороденчиња за здравствени работници, 2003, стр443 & Согласноста за прихранување/Дополнително хранење на Болницата Џон Хантер)