

SSWAHS

ماوؤں کے لیے معلومات اوپر کا دودھ پلانے کے بارے میں

Mother's Information Sheet For Complementary Feeding

نیشنل ہیلتھ اینڈ میڈیکل ریسرچ کونسل آف آسٹریلیا اور این ایس ڈبلیو بریسٹ فیڈنگ پالیسی کا کہنا ہے کہ کل مدتی ماں کا دودھ پینے والے بچوں کو کسی بھی قسم کے معمول کے مطابق دیئے جانے والے دوسرے دودھ سے حسب ذیل وجوہات کی بنا پر مستثنیٰ کرنا چاہیے :

- آپ کا اپنا دودھ جو آپکے بچے کا کسی بھی روگ (انفیکشن) سے بچاؤ کرتا ہے ، فارمولا دودھ اس میں مخل ہوتا ہے ۔

- آپ کا دودھ جتنا استعمال ہوگا ، اتنا بنے گا بھی ۔ اگر آپ کسی وقت اپنا دودھ نہ پلا سکیں یا اس کی جگہ بوتل دیں تو آپ کا دودھ کم بنے گا ۔

- اگر آپکی چھاتیوں سے دودھ نہیں نکلے گا تو یہ تکلیف دہ بوجائیں گی اور دودھ بنانا بند کر دیں گی ۔

- اس سے آپ کا بچہ فارمولا دودھ کے پروٹین سے الرجک بوجائے گا ۔

- بچے کی طلب پر دودھ پلانے سے شروع میں ہونے والے یرقان کے مواقع کم ہوجاتے ہیں ۔

- تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بچوں کو اسپتالوں میں زائد یا فالتو دودھ کا دینا اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد ماں کا اپنا دودھ پلانے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے ۔

آپ کو پرزور مشورہ دیا جاتا ہے کہ :

- آپ باقاعدگی سے اپنا دودھ دبا کر نکالا کریں برابر بچے کو ملتا رہے اور خون کا جماؤ نہ ہو ۔

- اپنے نکالے ہوئے دودھ کو جب ضرورت ہو استعمال کریں تاکہ گائے کے دودھ کے پروٹین سے الرجی کے امکانات کو کم کیا جاسکے ۔