

Feeding Tubes - Troubleshooting as at ___ / ___ / ___(date)

home enteral nutrition

..... nourishing lives at home

Khó khăn	Nguyên do khả hữu	Hành động	Liên hệ
Ống dẫn bị tuột do có sự cố ĐỪNG HOẢNG HÓT	<ul style="list-style-type: none"> • Xi-lanh cao su bị xẹp hoặc nổ • Ống dẫn bị kẹt • Dùng sức quá độ • Ói mửa trầm trọng • Ho nặng 	<p>Hãy thay ống dẫn càng sớm càng tốt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trẻ dưới 12 tuổi: trong vòng 45 phút • Người lớn: trong vòng 2 tiếng <p>Nhét ống Foley cùng cỡ hoặc ống dẫn nguyên thủy (rửa sạch bằng xà bông và nước). Dán băng keo cho ống dính vào da để chặn ống không chuyển động xuống dạ dày. Dùng cho dùng sữa, nước hoặc thuốc men cho đến khi ống dẫn thức ăn được cài nhét.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hãy tìm cách hội ý với y tá/bác sĩ..
Ống dẫn bị nghẽn	<ul style="list-style-type: none"> • Ống dẫn thức ăn bị cong hoặc thắt xoắn. • Ống dẫn không được xả súc thường xuyên. • Thuốc dùng không được nghiền đúng cách. • Thuốc dùng và sữa ăn không thích hợp • Các thức ăn trong dạ dày bị trở ngược vào ống dẫn • Thức ăn nghiền nhuyễn được đưa vào ống dẫn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm xem ống dẫn có bị thắt xoắn không. • Dùng cách đẩy và kéo bằng ống chích 50ml hoặc theo như chỉ dẫn để khai thông chỗ bị nghẽn. Trẻ sơ sinh: 5 – 10mls nước ấm Trẻ em <12tuổi: 10-20mls nước ấm Người lớn: 20 – 30mls nước ấm • Việc này có thể mất 30 phút • Xoa nhẹ ống dẫn giữa ngón tay của quý vị. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Cách khác (xin vui lòng chỉ rõ) <hr/>	<p>Hãy liên lạc với chuyên gia trợ dưỡng y tế hoặc tìm cách hội ý với y tá/bác sĩ nếu không chính được ống dẫn bị nghẽn HOẶC: Gọi điện thoại:</p> <hr/> <hr/> <hr/>
Rò rỉ chung quanh chỗ nhét ống dẫn làm cho da bị mẩn, đau xót, và nổi đỏ.	<ul style="list-style-type: none"> • Nhiều nguyên nhân. Trước tiên cần tìm ra nguyên nhân của rò rỉ và chấy nhều 	<ul style="list-style-type: none"> • Hãy đảm bảo là xi-lanh cao su đủ hơi . • Rửa chung quanh ống dẫn bằng nước ấm có xà bông, rửa lại và để khô ráo chỗ da này ba lần một ngày cho đến khi chấy ngứa ngáy, mẩn đỏ bớt đi. • Làn da chung quanh ống dẫn có thể cần được băng bó bảo vệ hoặc xức thuốc thuốc mỡ. Hãy liên lạc với chuyên gia trợ dưỡng y tế của quý vị. 	<p>Hãy liên lạc với chuyên gia trợ dưỡng y tế hoặc tìm cách hội ý với y tá/bác sĩ nếu rò rỉ cứ tiếp tục.</p>