

បណ្តាញព័ត៌មានអំពីជំងឺឆ្លង

# ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A គឺជាជំងឺថ្លើមបង្កដោយវីរុស។ វីរុសនេះត្រូវបានចម្លងតាមរយៈផ្លូវចេញពីលាមកទៅកាន់មាត់ ដោយមានរួមទាំងការបរិភោគចំណីអាហារឬទឹកដែលមានវីរុស ឬការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកកើតរោគ។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនិងការមានអនាម័យល្អ បង្ការកុំឲ្យមានការឆ្លងរោគនេះ។

កែតម្រូវចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី 3 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2007

## តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A គឺជាអ្វីទៅ?

‘ជំងឺរលាកថ្លើម’ មានន័យថា ការរលាកឬហើមនៃថ្លើម។ ជំងឺនេះអាចបណ្តាលដោយសារធាតុគីមីឬថ្នាំ ឬដោយសារការកើតមានរោគផ្សេងៗបង្កដោយវីរុស។ មូលហេតុទូទៅមួយនៃការកើតមានជំងឺរលាកថ្លើមគឺបណ្តាលមកពីវីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ។ ការឆ្លងវីរុសជំងឺរលាកថ្លើមមួយប្រភេទ មិនផ្តល់ការការពារទល់នឹងការឆ្លងវីរុសជំងឺថ្លើមប្រភេទផ្សេងៗទៀតទេ។

## តើជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

រោគសញ្ញាទាំងឡាយមានរួមទាំងការមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ឈឺចុកចាប់ គ្រុនក្តៅ ចង្កោរ មិនឃ្លានចំណីអាហារ ឆ្អល់ពោះ បន្ទាប់មកទៀតមានទឹកនោមល្អក់ខ្លាំង លាមកពណ៌ស្លែកស្លាំង និងខាត់លឿង (ភ្នែកនិងស្បែកមានពណ៌លឿង)។ ជាធម្មតា រោគសញ្ញាទាំងនេះមានរយៈពេលចាប់ពីមួយទៅបីអាទិត្យ (ប៉ុន្តែរោគសញ្ញាខ្លះអាចមានរយៈពេលយូរជាងនេះ) ហើយបន្ទាប់មកទៀត មានការរើបរើជាសះស្បើយសឹងតែទាំងស្រុងមកវិញ។ ជាធម្មតា កុមារតូចៗដែលកើតមានជំងឺនេះពុំមានរោគសញ្ញាឡើយ។ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A មិនបណ្តាលឲ្យមានជំងឺថ្លើមរយៈពេលយូរទេ ហើយការបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A កំរើតមានណាស់។ ជាធម្មតាចន្លោះពេលចាប់ពីការប៉ះពាល់នឹងវីរុសរហូតដល់ពេលមានរោគសញ្ញាគឺបួនអាទិត្យ ប៉ុន្តែវាអាចមានចាប់ពីពីរទៅប្រាំពីរអាទិត្យណាស់។

## តើជំងឺនេះអាចចម្លងតាមវិធីណា?

អ្នកកើតជំងឺនេះអាចចម្លងវីរុសទៅអ្នកដទៃចាប់ពីពេលពីរអាទិត្យមុនពេលកើតមានរោគសញ្ញា រហូតដល់ពេលមួយអាទិត្យ ក្រោយពីចេញខាត់លឿង (សរុបពេលប្រហែលបីអាទិត្យ)។ បរិមាណដ៏ច្រើននៃវីរុសត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងលាមកនៃអ្នកកើតជំងឺនេះ ក្នុងអម្បុងពេលអាចចម្លងរោគ។ វីរុសនេះអាចរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងបរិស្ថានចំនួនច្រើនអាទិត្យ នៅក្នុងស្ថានភាពត្រឹមត្រូវ (ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងទឹកស្អុយជាដើម)។

ជាធម្មតា ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A អាចចម្លងបាននៅពេលដែលមនុស្សធម្មតាលេបវីរុសពីអ្នកជំងឺតាមរយៈការ៖

- បរិភោគម្ហូបអាហារដែលមានវីរុសនេះ
- បរិភោគទឹកដែលមានវីរុសនេះ
- កាន់ក្រណាត់ទ្រុឌាប កំរាលពូកនិងស្រោមខ្លើយ ព្រមទាំងកន្លែងពោះគោដែលប្រឡាក់លាមកនៃអ្នកកើតជំងឺ
- ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ (មានរួមទាំងការរួមភេទ)ជាមួយអ្នកកើតជំងឺ។

# សេចក្តីវាយការណ៍អំពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A

## ត្រូវបានតាមដានរកឃើញថាមានប្រភពចេញពី៖

- ការឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀត ដោយមានរួមទាំងក្នុងចំណោមបុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នា
- ការបរិភោគទឹកមានលាយឡំដោយទឹកស្អុយ
- ការបរិភោគចំណីអាហារដែលមានលាយឡំដោយទឹកស្អុយ ដូចជាពពួកសត្វលៀសជាដើម
- ការបរិភោគចំណីអាហារដែលមានលាយមេរោគចេញពីអ្នកធ្វើម្ហូបអាហារដែលកើតជំងឺ។

ការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A នៅតែចោទជាបញ្ហាទៅទៀតជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរទៅបរទេស ជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកំពុងរីកចំរើន ដែលសម្បូរដោយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ។

## តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺនេះ?

អ្នកដែលមិនធ្លាប់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និងមិនដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគទល់នឹងជំងឺនេះ មានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺនេះ។

## តើវិធីបង្ការជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

### ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ

មានថ្នាំបង្ការរោគដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពសំរាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ។ ថ្នាំបង្ការរោគនេះអាចត្រូវការពេលដល់ទៅពីរអាទិត្យដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសំរាប់ការពារទល់នឹងរោគនេះបាន។

ថ្នាំបង្ការរោគគួរចាក់ឲ្យក្រុមអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដូចតទៅនេះ៖

- អ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំងឡាយដែលសម្បូរដោយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A (ប្រទេសកំពុងរីកចំរើនភាគច្រើន)
- អ្នកធ្វើដំណើរញឹកញាប់ទៅកាន់សហគមន៍ជនបទនិងជនជាតិដើមនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល
- បុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នា
- បុគ្គលិកធ្វើការនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅពេលថ្ងៃ និងនៅតាមមគ្គុយុទ្ធសាលា
- អ្នកពិការខាងប្រាជ្ញាស្មារតី និងអ្នកថែទាំអ្នកទាំងនោះ
- បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពខ្លះដែលធ្វើការនៅក្នុង ឬជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើម
- បុគ្គលិកធ្វើការនៅតាមទឹកស្អុយ
- ជាងបំពង់
- អ្នកចាក់គ្រឿងញៀន
- អ្នកជំងឺដែលកើតរោគថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ
- អ្នកមានជំងឺឈាមមិនកក ដែលប្រហែលជាទទួលជំនួយឈាម។

## តើអាចធ្វើអ្វីទៀតបានដើម្បីថ្លៀសវាងកុំឲ្យមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A?

ជនរាល់រូបគួរលាងសម្អាតដៃរបស់ខ្លួនបានបានម៉ត់ចត់ជាដាច់ខាតជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកហូរចេញពីក្បាលម៉ាស៊ីន រយៈពេលយ៉ាងតិច 10 វិនាទី ហើយសម្អាតដៃជាមួយនឹងកន្សែងពោះគោស្អាត៖

- នៅក្រោយពីទៅបង្គន់
- មុនពេលបរិភោគចំណីអាហារ
- មុនពេលធ្វើម្ហូបអាហារឬរៀបចំភេសជ្ជៈ
- ក្រោយពីកាន់វត្ថុទាំងឡាយដូចជាក្រណាត់ទ្រនាប់ និងស្រោមអនាម័យ។

## តើអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីចៀសវាងកុំឲ្យចម្លងទៅអ្នកដទៃ?

បើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ក្រៅអំពីការលាងសម្អាតដៃលោកអ្នកឲ្យបានម៉ត់ចត់ លោកអ្នកគួរចៀសវាងសកម្មភាព ដូចតទៅនេះ នៅក្នុងពេលអាចចម្លងរោគនេះបាន (ពោលគឺថា រហូតទាល់តែពេលយ៉ាងតិចមួយអាទិត្យ ក្រោយពីចេញខ្លួនលឿង ហើយ)៖

- កុំធ្វើម្ហូបអាហារឬរៀបចំភេសជ្ជៈសំរាប់អ្នកដទៃ
- កុំប្រើបាទ សមស្លាបព្រា កែវពែង ច្របូកច្របល់ជាមួយអ្នកដទៃ
- កុំប្រើស្រោមខ្លើយនិងកំរាលពួក ព្រមទាំងកន្លែងពោះគោច្របូកច្របល់ជាមួយអ្នកដទៃ
- កុំរួមភេទ
- លាងសម្អាតសមស្លាបព្រា កែវពែងនៅក្នុងទឹកសាប៊ូ ហើយប្រើម៉ាស៊ីនបោកខោអាវដើម្បីបោកកក់ស្រោមខ្លើយនិងកំរាល ពួកព្រមទាំងកន្លែងពោះគោ។

## អ្នកតទៅនេះដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A មិនគួរទៅធ្វើការឬទៅសាលារៀនឡើយ

នៅក្នុងពេលដែលអាច ចម្លងរោគនេះបាន៖

- អ្នកដែលរៀបចំឬធ្វើម្ហូបអាហារ ឬភេសជ្ជៈ
- អ្នកដែលការងាររបស់ខ្លួនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ខ្លួនជិតស្និទ្ធ ដូចជាអ្នកថែទាំកុមារ និងបុគ្គលិកសុខាភិបាល
- បុគ្គលិក កុមារ និងជនពេញវ័យមិនគួរធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងថែទាំកុមារ ឬសាលារៀនទេ នៅក្នុងពេលដែលអាច ចម្លងរោគបាន។
- អ្នកជំងឺទាំងអស់គួរឆែកសាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខ្លួនសិន មុនពេលទិលទៅធ្វើការឬសាលារៀនវិញ។

## តើការវិនិច្ឆ័យរោគធ្វើទៅតាមរបៀបណា?

រោគវិនិច្ឆ័យត្រូវបានផ្អែកលើរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺ និងត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈការធ្វើតេស្តឈាមដែលបង្ហាញអង្គបដិបក្ខ IgM ទៅនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ។

## តើវិធីព្យាបាលជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

គ្មានការព្យាបាលជាក់លាក់សំរាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ទេ។ ជាធម្មតា សមាជិកគ្រួសារដែលប៉ះពាល់អ្នកកើតជំងឺនិងអ្នកដៃគូ រួមភេទជាមួយនិងអ្នកកើតជំងឺ ត្រូវចាក់ថ្នាំ immunoglobulin ។ ការចាក់ថ្នាំនេះអាចបង្ការឬកាត់បន្ថយជំងឺ បើបានចាក់ថ្នាំនេះ ក្នុងរង្វង់ពេលពីរអាទិត្យក្រោយពីបានប៉ះនឹងអ្នកកើតជំងឺ។

## តើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមានវិធានការឆ្លើយតបអ្វីខ្លះ?

- វេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរពេទ្យ និងមន្ទីរពិសោធន៍ ត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់ដោយលាក់ការសម្ងាត់នូវករណីនៃការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ A ទៅកាន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ: (Public Health Unit) ក្នុងតំបន់។
- បុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនឹងធ្វើការជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត អ្នកជំងឺឬគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺ ដើម្បីរកមើលដឹងអ្នកប៉ះពាល់ ជិតស្និទ្ធទាំងឡាយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងជំងឺនេះ និងរៀបចំឲ្យអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីជំងឺនេះ។ បុគ្គលិកផ្នែក សុខភាពសាធារណៈធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំពិសេសដើម្បីគ្រប់គ្រងករណីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ចំពោះអ្នកដែលទៅចូល រួមឬធ្វើការនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងចំពោះអ្នកដែលធ្វើម្ហូបអាហារដើម្បីលក់។

បុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក៏អង្កេតអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ផងដែរ ដើម្បីរកមើលដឹងមូលហេតុ នៃការឆ្លងរាតត្បាតនេះ គ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាត និងបង្ការកុំឲ្យមានការចម្លងតទៅទៀត។

**ព័ត៌មានបន្ថែម - ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) នៅក្នុងរដ្ឋ NSW**

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិត ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់ ឬមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍របស់លោកអ្នក។ សូមរកមើលនៅក្រោមពាក្យ *NSW Government* នៅផ្នែកខាងមុខនៃសៀវភៅទូរស័ព្ទ *White Pages* ។

តំបន់ទីក្រុង	ទីតាំង	លេខទូរស័ព្ទ	តំបន់ជនបទ	ទីតាំង	លេខទូរស័ព្ទ
<b>Northern Sydney/Central Coast</b>	Hornsby	02 9477 9400	<b>Greater Southern</b>	Goulburn	02 4824 1837
	Gosford	02 4349 4845		Albury	02 6080 8900
<b>South Eastern Sydney/Illawarra</b>	Randwick	02 9382 8333	<b>Greater Western</b>	Broken Hill	08 8080 1499
	Wollongong	02 4221 6700		Dubbo	02 6841 5569
<b>Sydney South West</b>	Camperdown	02 9515 9420		Bathurst	02 6339 5601
<b>Sydney West</b>	Penrith	02 4734 2022	<b>Hunter/New England</b>	Newcastle	02 4924 6477
	Parramatta	02 9840 3603		Tamworth	02 6767 8630
<b>Justice Health Service</b>	Matraville	02 9311 2707	<b>North Coast</b>	Port Macquarie	02 6588 2750
<b>NSW Department of Health</b>	Nth Sydney	02 9391 9000		Lismore	02 6620 7500
<b>NSW Health:</b>		<a href="http://www.health.nsw.gov.au">www.health.nsw.gov.au</a>			