

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່

ໂຮກຕັບອັກເສບຊນິດ B ແມ່ນການຕິດເຊື້ອທີ່ຮ້າຍແຮງຊນິດນຶ່ງ ຊຶ່ງແຜ່ຜ່າຍໂດຍທາງເລືອດຫຼືນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ. ຂໍ້ແນະນຳໃຫ້ໄດ້ກນ້ອຍທຸກຄົນ, ແລະຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດພະຍາດນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ. ການຮ່ວມເພດແບບປອດພ້ຍແລະການໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຂ້າເຊື້ອແລ້ວເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນ.

ໂຮກຕັບອັກເສບຊນິດ B

ສະບັບແກ້ໄຂປັບປຸງ: 06 ທັນວາ 2007

ໂຮກຕັບອັກເສບຊນິດ B ແມ່ນຫຍັງ?

- ໂຮກຕັບອັກເສບຊນິດ B ແມ່ນການຕິດເຊື້ອທີ່ຕັບຊຶ່ງເກີດຈາກໄວຣັສຊນິດນຶ່ງຊຶ່ງເອີ້ນວ່າເຮັບພາທາຍທິສ B (hepatitis B). 'Hepatitis' ໝາຍເຖິງ "ອາການອັກເສບຫຼື ອາການໃຄ່ຂອງຕັບ".
- ເມື່ອຕິດເຊື້ອແລ້ວ, ຄົນຜູ້ນຶ່ງອາດຈະຂະຈັດການຕິດເຊື້ອນັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງຂຶ້ນຕື່ມ; ຫຼື
- ກາຍເປັນການຕິດເຊື້ອແບບຊຳເຮື້ອ. ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອແບບຊຳເຮື້ອນັ້ນບາງເທື່ອກໍເປັນ "ຜູ້ຖືເຊື້ອ" ໄປໃນຕົວ.
- ບາງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອແບບຊຳເຮື້ອອາດມີບັນຫາທາງສຸຂະພາບທີ່ເນື່ອງມາຈາກການຕິດເຊື້ອ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນກໍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ. ການທີ່ຄົນຜູ້ນຶ່ງຈະສາມາດຂະຈັດການຕິດເຊື້ອໄດ້ຫຼືກາຍເປັນການຕິດເຊື້ອແບບຖາວອນນັ້ນ ຂຶ້ນກັບອາຍຸຂອງເຂົາເປັນສ່ວນ ໃຫຍ່: 90% ຂອງແອນ້ອຍເກີດໃໝ່, 20-50% ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 1-5 ປີ, ແລະ 1-10% ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸໃຫຍ່ ແດ່ແລ້ວ ແລະ ພວກຜູ້ໃຫຍ່, ໄດ້ກາຍມາເປັນຄົນຕິດເຊື້ອແບບຊຳເຮື້ອ. ຄົນໃດທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວກໍຈະຕິດໄປຈົນຕອດຊີວິດ, ແລະອາດຈະເປັນໂຮກຕັບແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ຫຼາຍປີຫຼັງຈາກນັ້ນ ອາດຈະເກີດອາການແຊກຊ້ອນເຊັ່ນ ໂຮກຕັບແຂງ ຫຼື ມະເຮັງຕັບ.

ໂຮກນີ້ມີອາການຢ່າງໃດແດ່?

- ຫຼາຍໆຄົນຈະບໍ່ສະແດງອາການຫຍັງເມື່ອຕິດເຊື້ອໃໝ່ໆ.
- ເມື່ອໂຮກອອກອາການ ຕາມປົກກະຕິຈະມີອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ ໂຮກຂີ້ໝາກເຫຼືອງ (ຜິວໜັງແລະຕາເປັນສີເຫຼືອງ), ປັດສະວະສີຄໍາ, ອາຈົມສີຊືດ, ເມື່ອຍອ່ອນເພ້ຍ, ເຈັບໃນຊ່ອງທ້ອງ, ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ, ບຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ ແລະ ເຈັບຕາມຂໍ້.

ໂຮກນີ້ແຜ່ຜາຍໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໂຮກຕັບອັກເສບ ຊນິດ B ແຜ່ຜາຍໄປຫາຄົນອື່ນ ເມື່ອເລືອດຫຼືນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ (ເຊັ່ນນ້ຳລາຍ, ນ້ຳອະສຸຈີ ແລະ ນ້ຳເມືອກໃນ ຊ່ອງຄອດ) ຊຶ່ງມີເຊື້ອໄວຣັສ hepatitis B ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນໂດຍທາງ:

- ຜິວໜັງທີ່ຂາດ
- ເຍື່ອເມືອກ
- ທາງເສັ້ນເລືອດໂດຍການໃຊ້ແນວສັກຢາຮ່ວມກັນ, ຫຼືໃຊ້ເຂັມຫຼັງຈາກຄົນຕິດເຊື້ອໃຊ້ແລ້ວ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກເຂັມປັກ, ຫຼືໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີເຊື້ອໂຮກ.
- ຮ່ວມເພດກັບຄົນທີ່ມີເຊື້ອໂຮກໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງອະນາມັຍ.
- ນອກນີ້ ໂຮກຕັບອັກເສບຊນິດ B ກໍສາມາດແຜ່ຜາຍໃຫ້ແອນ້ອຍຕອນຄອດໄດ້ ຈາກແມ່ທີ່ມີເຊື້ອໂຮກ.

ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໂຮກນີ້?

ຈຳພວກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໂຮກນີ້ ຮວມມີ:

- ຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ
- ຄົນທີ່ໃຊ້ຢາແບບໃຊ້ເຂັມສັກ
- ແອນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກແມ່ຊຶ່ງຕິດເຊື້ອແລ້ວ
- ຄົນທີ່ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍຄົນ
- ຜູ້ຊາຍທີ່ຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຊາຍດ້ວຍກັນ
- ຄົນເຈັບທີ່ຟອກເລືອດ
- ພະນັກງານດູແລສຸຂພາບ
- ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດໃນປະເທດທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ hepatitis B ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ
- ຄົນໃນຄອບຄົວທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອ hepatitis B
- ຄົນຄຸກ.

ຈະປ້ອງກັນໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ສັກຢາປ້ອງກັນ

ຢາສັກວັກຊີນ hepatitis B ແມ່ນຖືວ່າໃຊ້ໄດ້ຜົນຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ.

ຂໍແນະນຳໃຫ້ຄົນຈຳພວກດັ່ງກ່າວ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ:

- ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຕອນເກີດໃໝ່, ເມື່ອອາຍຸໄດ້ສອງເດືອນ, ສີ່ເດືອນ ແລະ ຫົກເດືອນ. ແພດຈະສັກຢາວັກຊີນນີ້ໃຫ້ໄດ້ໂຮງໝໍ ຄອດລູກ ແລະ ທ່ານໝໍຄອບຄົວຂອງທ່ານກໍສາມາດສັກໃຫ້ໄດ້ ຫຼື ທີ່ ຄລິນິກ ຊຶ່ງໃຫ້ການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທົ່ວໆໄປ.
- ເດັກອາຍຸ 12 ປີທຸກຄົນທີ່ຍັງໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນຕອນຍັງເປັນແອນ້ອຍ. ມີການສັກຢາວັກຊີນນີ້ ໃຫ້ຕາມໂຮງຮຽນມັທຍົມ.
- ຄົນໃດທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວດຽວກັນຫຼືມີການຮ່ວມເພດກັບຄົນທີ່ມີເຊື້ອໂຮກນີ້.

- ຜູ້ຊາຍທີ່ຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຊາຍດ້ວຍກັນ
- ຄົນທີ່ມີເຊື້ອກາມະໂຣກຢູ່ແລ້ວ
- ຄົນທີ່ໃຊ້ຢາໂດຍການສັກ
- ຄົນເຈັບທີ່ຟອກເລືອດ
- ຄົນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຜລິດພັນຈາກເລືອດເພື່ອປິ່ນປົວອາການເລືອດຈັບກັນເປັນກ້ອນ
- ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຕັບຊຳເຮື້ອຫຼືເປັນໂຣກຕັບອັກເສບຊນິດ C
- ຜູ້ອາສັຍຫຼືພະນັກງານຕາມສະຖານທີ່ດູແລຄົນພິການທາງສມອງ
- ຄົນຄຸກແລະພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມສະຖານທີ່ກັກຂັງດັດສ້າງ
- ພະນັກງານດູແລສຸຂພາບ
- ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງເຢັນເກັບສົບ
- ພະນັກງານສຸກເສີນ.

ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຣກແຜ່ຜ່າຍ

ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຣກ hepatitis B ແຜ່ຜ່າຍ:

- ໄປຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ
- ໃຊ້ຖົງອະນາມັຍເມື່ອຮ່ວມເພດກັບຄູ່ຮ່ວມເພດຄົນໃໝ່ຫຼືກັບຄູ່ຄອງທີ່ມີເຊື້ອ hepatitis B ແລ້ວ ຖ້າທ່ານເອງຍັງບໍ່ໄດ້ສັກຢາ ປ້ອງກັນເທື່ອ.
- ຖ້າທ່ານຖືພາ, ທ່ານຄວນໄປກວດເລືອດຫາເບິ່ງເຊື້ອ hepatitis B; ເດັກທີ່ຄອດຈາກແມ່ຊຶ່ງມີເຊື້ອ hepatitis B ຕ້ອງໄດ້ ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ hepatitis B immunoglobulin (HBIG) ແລະຕ້ອງສັກພາຍໃນ 12 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຄອດ.
- ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງມືການສັກຢາຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ
- ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຂອງໃຊ້ສ່ວນຕົວໃດໆທີ່ອາດມີເລືອດຕິດຢູ່ (ເຊັ່ນ ມີດແຖ ຫຼື ແປງຄູແຂ້ວ)
- ຖ້າຈະສັກລາຍຫຼືເຈາະບ່ອງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນສັກໃຫ້ນັ້ນໃຊ້ເຄື່ອງ ມືທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມໂລດຫຼືທີ່ໄດ້ ຂ້າເຊື້ອແລ້ວ.
- ຄົນທີ່ບໍ່ມີພູມຕ້ານ ທີ່ຈັບບາຍຄົນທີ່ມີເຊື້ອ HBV ຕ້ອງໄດ້ຮັບ HBIG ແລະ ສັກຢາກັນໂດຍດ່ວນທີ່ສຸດ, ຖ້າແມ່ນຈັບບາຍເລືອດ ແມ່ນພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ; ຖ້າແມ່ນການຮ່ວມເພດແມ່ນພາຍໃນ 24 ມື້.

ຖ້າທ່ານມີເຊື້ອໂຣກນີ້ຢູ່ໃນຕົວ:

- ຢ່າບໍຣິຈາກເລືອດ, ອະວັຍວະທາງໃນ ຫຼືເນື້ອເຍື່ອ ຖ້າທ່ານມີເຊື້ອ hepatitis B
- ໃຫ້ບອກທ່ານໝໍຫຼືໝໍແຂ້ວວ່າທ່ານມີເຊື້ອໂຣກນີ້
- ໃຫ້ຮະມັດຮະວັງເປັນພິເສດ ເພື່ອໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນມາຊຸມຖືກເລືອດຫຼືນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ໃຫ້ເຊັດຮອຍເລືອດ ແລະນ້ຳຕ່າງໆ ດ້ວຍຜ້າຂົນໝູແລະທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ ດ້ວຍນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດແລະນ້ຳ ຈົນຮອຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໝົດໄປ. ຖ້າເລືອດເປື້ອນເປັນຮອຍໃຫຍ່ຢູ່ເທິງພິມ, ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມສະອາດ ດ້ວຍແຊມພູຫຼືທຳຄວາມສະອາດ ດ້ວຍອາຍນ້ຳ.

- ໃຫ້ປິດປາກບາດຂອງທ່ານດ້ວຍຜ້າພັນບາດທີ່ກັນນ້ຳ
- ໃຫ້ໃຊ້ຖົງອະນາມັຍກັບຄູ່ຮ່ວມເພດຄົນໃໝ່, ແລະກັບຄູ່ຮ່ວມເພດທີ່ຍັງບໍ່ມີພູມຕ້ານທານ.

ຈະກວດຫາໂຣກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ການກວດເລືອດຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າຄົນໜຶ່ງເຄີຍໄດ້ຕິດເຊື້ອ hepatitis B ມາກ່ອນບໍ່ໃນອະດີດ, ແລະສາມາດບອກໄດ້ ດ້ວຍວ່າຄົນໜຶ່ງນັ້ນໄດ້ຕິດເຊື້ອແບບຊຳເຮື້ອບໍ່. ການກວດວິທີອື່ນໆ, ເຊັ່ນກວດເບິ່ງການທຳງານຂອງຕັບ, ກໍສາມາດບອກໄດ້ເຊັ່ນກັນ ວ່າຕັບໄດ້ຖືກທຳລາຍຫຼືບໍ່.

ຈະປິ່ນປົວພຍາດນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຄົນບາງຄົນອາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປິ່ນປົວໂດຍໃຊ້ວິທີຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສ. ໃຫ້ປຶກສາກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານເບິ່ງວ່າ ຈະມີວິທີ ປິ່ນປົວຢ່າງໃດແດ່. ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ hepatitis B ແບບຊຳເຮື້ອຄວນດູແລຮັກສາຕັບຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີ ແລະ ຄວນສັກຢາກັນ hepatitis A ດ້ວຍຖ້າຍັງບໍ່ມີພູມຕ້ານທານມາກ່ອນ. ການຕື່ມເຫຼົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ຕັບຂອງທ່ານມີອາການເລວຮ້າຍລົງໄດ້.

ຜແນກສາທາຣະນະສຸກມີທ່າທີ່ຢ່າງໃດຕໍ່ໂຣກນີ້?

Hepatitis B ແມ່ນພຍາດທີ່ທັງທ່ານໝໍແລະທ້ອງທົດລອງຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ທາງການຊາບ. ພະນັກງານຂອງຜແນກ ສາທາຣະນະສຸກຈະທຳການຕິດຕາມການຕິດເຊື້ອຣາຍໃໝ່ເພື່ອຄົ້ນຫາສາເຫດການສ່ຽງ ແລະຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ໂຣກແຜ່ຕື່ມອອກໄປ.

ຣາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຣາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກະຣຸນາຕິດຕໍ່ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ຜແນກສາທາຣະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສູນອະນາໄມຊຸມຊົນ - ໃຫ້ເບິ່ງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຖບານປະຈຳຣັດ *NSW Government* ທາງໜ້າຂອງສຸມດ ໂທຣະສັບ (White Pages).

ເຂດໃນຕົວເມືອງ	ສະຖານທີ່	ເລກໂທຣະສັບ	ເຂດຊົນນະບົດ	ສະຖານທີ່	ເລກໂທຣະສັບ
Northern Sydney/Central Coast	Hornsby	02 9477 9400	Greater Southern	Goulburn	02 4824 1837
	Gosford	02 4349 4845		Albury	02 6080 8900
South Eastern Sydney/Illawarra	Randwick	02 9382 8333	Greater Western	Broken Hill	08 8080 1499
	Wollongong	02 4221 6700		Dubbo	02 6841 5569
Sydney South West	Camperdown	02 9515 9420		Bathurst	02 6339 5601
Sydney West	Penrith	02 4734 2022	Hunter/New England	Newcastle	02 4924 6477
	Parramatta	02 9840 3603		Tamworth	02 6767 8630
Justice Health Service	Matraville	02 9311 2707	North Coast	Port Macquarie	02 6588 2750
NSW Department of Health	Nth Sydney	02 9391 9000		Lismore	02 6620 7500
NSW Health: www.health.nsw.gov.au					