



# การตรวจ COVID-19

## ควรตรวจ COVID-19 เมื่อไร?

- เมื่อท่านมีอาการ COVID-19
- ท่านมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนักและเพิ่มสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเร็วๆ นี้
- ท่านเป็นผู้ที่อยู่ในครัวเรือน หรือมีความเสี่ยงสูงหรือปานกลางในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ COVID-19



## ใครมีความเสี่ยงต่อการป่วยหนักมากขึ้น?

- ผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
- สตรีมีครรภ์
- ชาวอะบอริจินัล ทอร์เรส สเตท ไอสแลนเดอร์ และแปซิฟิก ไอสแลนเดอร์ (อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป)
- ผู้ที่เป็นโรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจรุนแรง โรคปอดเรื้อรัง (รวมถึงอาการหอบที่รุนแรงที่ต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) โรคตับหรือไตเรื้อรังรุนแรง กำลังเป็นมะเร็ง หรือภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
- ผู้พิการบางคนรวมถึงผู้ที่มีความพิการที่มีผลกระทบต่อปอด หัวใจหรือระบบภูมิคุ้มกัน
- ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและสถานดูแลผู้พิการ
- ผู้ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่ฉีดวัคซีน

## ควรตรวจ COVID-19 แบบไหน?


มีการตรวจที่ต่างกันสองอย่างที่ใช้ในการตรวจว่าท่านเป็น COVID-19 หรือไม่ การตรวจแรพิด แอนติเจน (RAT) ที่ทำได้ด้วยตนเอง และการตรวจ PCR (การเข้ดจุมูกและลำคอ) ที่ทำที่คลินิกตรวจ

- หากท่านมีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยหนัก ท่านควรทำการตรวจ PCR หากท่านไม่สามารถได้ผลการตรวจ PCR อย่างรวดเร็ว ควรตรวจด้วยแรพิด แอนติเจน (ถ้ามี) ในระหว่างที่คอยฟังผลการตรวจ PCR
- หากท่านไม่เสี่ยงสูงต่อการป่วยหนัก ตรวจด้วยแรพิด แอนติเจน นอกเสียจากว่าแพทย์ของท่านบอกให้ตรวจด้วย PCR



## ควรทำอย่างไรถ้าผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก?

- ถ้าได้ผลตรวจ PCR เป็นบวก แม้ว่าท่านไม่มีอาการ ท่านยังติดเชื้อ COVID-19 ท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวกและจัดการกับ COVID-19 อย่างปลอดภัยที่บ้าน
- ถ้าท่านได้ผลตรวจแรพิด แอนติเจนเป็นบวก ลงทะเบียนผลตรวจกับ Service NSW และปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก และจัดการกับ COVID-19 อย่างปลอดภัยที่บ้าน



หากท่านมีปัญหาด้านสุขภาพอย่างหนึ่งอย่างใด และต้องการความช่วยเหลือทางภาษา โปรดโทร TIS 131 450 และขอต่อ Health Direct หมายเลข 1800 022 222