

الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19

هناك نوعان من الاختبارات المتاحة لك لكشف الإصابة بكوفيد-19.

اختبارات المستضد السريعة – وهي طريقة فورية للتحقق من وجود فيروس كوفيد-19



اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل – وهي مسحة تؤخذ من الأنف والحنجرة في عيادة أو مركز فحص ويتم إرسالها إلى المختبر لتحليلها.



من يجب أن يجري اختبار المستضد السريع؟

- الأشخاص الذين لديهم أعراض الإصابة
- الأشخاص المخالطون لمصاب (لديه نتيجة اختبار إيجابية) سواء حدثت المخالطة في المسكن أم مكان العمل أو التعليم أم في نشاط اجتماعي مشترك
- أي شخص قبل توجهه للمشاركة في احتفال أو مناسبة مع عدد كبير من الحضور، أو قبل زيارة أفراد من الأسرة لديهم ضعف في المناعة أو أمراض مزمنة.
- أي شخص قادم من خارج البلاد (المسافرين القادمون بالجو وطواقم الطائرات).

ما الذي يجب فعله في حال الحصول على نتيجة إيجابية من اختبار المستضد السريع؟



إذا أظهر اختبار المستضد السريع نتيجة إيجابية فعلى الأغلب أنت مصاب بكوفيد-19:

الخطوة التالية	احتمالات التعرّض للإصابة	الأعراض	نتيجة الفحص
لديك حالة إصابة مؤكدة، اتبع النصيحة الطبية للأشخاص الذين تكون نتيجة فحصهم إيجابية على الرابط التالي people testing positive for COVID-19	إذا حصلت المخالطة مع مصابين معروفين وغير معروفين	✓	✓
لديك حالة إصابة مؤكدة، اتبع النصيحة الطبية للأشخاص الذين تكون نتيجة فحصهم إيجابية على الرابط التالي people testing positive for COVID-19	إذا حصلت المخالطة مع مصابين لديهم نسبة تعرّض عالية أو مشاركين بالمسكن	✓ or ✗	✓
قد تكون لديك حالة إصابة، قم بإجراء اختبار مستضد سريع آخر خلال 24 ساعة أو اخضع لاختبار PCR في مركز طبي يجري هذا الاختبار.	إذا حصلت المخالطة مع مصابين مجهولين	✗	✓

ما الذي يجب فعله في حال الحصول على نتيجة سلبية من اختبار المستضد السريع؟



إذا كنت تعيش في مسكن مشترك مع شخص مصاب أو كان احتمال تعرّضك للفيروس كبيراً نتيجة المخالطة مع شخص مصاب بكوفيد فيجب أن تستمر في العزل الذاتي لمدة سبعة أيام، ويجب عليك اتباع النصيحة الطبية الموجهة للأشخاص المعرضين للإصابة بكوفيد-19 ريثما يتم تحديد احتمال إصابتك [advice for people exposed to COVID-19 to determine your risk.](#) ولتحديد فيما إذا كان احتمال تعرضك للفيروس كبيراً، يمكنك اعتماد المعلومات الواردة في الرابط الإلكتروني التالي [Information for people exposed to COVID-19](#) واتباع النصيحة المتعلقة بالعزل.

إذا ظهرت عليك أعراض مشابهة لأعراض كوفيد، عليك إجراء اختبار مستضد سريع آخر خلال 24 ساعة أو الخضوع لاختبار PCR. وإذا كان الاختبار الثاني إيجابياً فيعني ذلك أن إصابتك تُعتبر مؤكدة؛ أما إذا كان الاختبار الثاني سلبياً فيجب أن تعزل نفسك حتى تتلاشى الأعراض.

من يجب أن يخضع لاختبار PCR؟

عليك إجراء اختبار PCR في إحدى الحالات التالية:

- إذا كانت لديك أعراض كوفيد-19 ولكن نتيجة اختبار المستضد السريع كانت سلبية وفي نفس الوقت يوجد احتمال كبير لأن تصاب بمرض شديد بسبب الفيروس كونك امرأة حاملاً أو لديك (لديك) انخفاض في كفاءة الجهاز المناعي أو كونك من السكان الأصليين أو سكان جزر مضيق توريس أو جزر المحيط الهادئ أو لأنك لم تأخذ جرعات اللقاح.
- إذا كانت لديك أعراض الإصابة ولا تستطيع الحصول على اختبار المستضد السريع.
- إذا طُلب منك أن تجري فحص PCR من قبل مختص بتقديم الرعاية الصحية.

إذا كانت نتيجة الفحص الذي أجري لي إيجابية، ما الذي عليّ فعله؟

اتبع النصيحة الطبية للأشخاص الذين تكون نتيجة فحصهم إيجابية على الرابط الإلكتروني التالي [people testing positive for COVID-19](#).