

## تصريح إعلامي

الثلاثاء 5 تموز/يوليو 2022

### نيو ساوث ويلز تواجه أحدث موجة COVID-19

يُطلب من الجميع في نيو ساوث ويلز التأكد من تلقّي كافة لقاحات COVID-19 الخاصة بهم وممارسة السلوكيات الآمنة من COVID حيث يستمر نمو موجة العدوى الحالية، التي يقودها المتغيران الفرعيان BA.4 و BA.5.

هناك مخاوف من زيادة عدد الأمراض الخطيرة والوفيات بشكل كبير ما لم يقم المزيد من الناس بالحصول على جرعات اللقاح المعززة على الفور وممارسة السلوكيات الآمنة من COVID.

وقال وزير الصحة Brad Hazzard إن الأرقام تظهر أن 56 في المائة (1232) من الوفيات المرتبطة بـ COVID هذا العام كانت لأشخاص تلقوا جرعتين أو أقل.

ومما قاله السيد Hazzard: "نحن في بداية الموجة الثالثة من Omicron والتي من المحتمل أن تصل ذروتها في أواخر تموز/يوليو أو أوائل آب/أغسطس. هذه الزيادة في انتقال العدوى في المجتمع تجلب معها مخاطر متزايدة بشكل كبير للأشخاص الذين لم يتلقوا كافة اللقاحات الموصى بها لهم.

"إن أفضل طريقة لحماية نفسك من المرض الخطير أو ما هو أسوأ منه هو الحصول على كافة اللقاحات المتاحة لك."

إذا كنت ملقحًا بالكامل، فستحصل على حماية أكبر بنسبة 65 في المائة لإمكانية إدخالك إلى المستشفى أو الوفاة بسبب Omicron مما لو كنت قد تلقيت جرعتين من اللقاح فقط، وفقًا لبيانات المركز الوطني لأبحاث التحصين والمراقبة.

وقالت الدكتورة Kerry Chant كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز إنه بالإضافة إلى حجز موعد لتلقي الجرعة المعززة، يجب على الناس ممارسة التفكير السليم ولبس كمامة الوجه في الأماكن الداخلية العامة، عندما لا يمكن الحفاظ على التباعد الجسدي.

ومما قالته الدكتورة Chant: "إن كمامات الوجه، وممارسة نظافة اليدين الصحية، والبقاء في المنزل عند المرض، وفحص نفسك عند ظهور الأعراض، والتباعد الجسدي، كل هذه إجراءات ليست جديدة علينا.

"ما لم نعمل معًا مرة أخرى، ستضرب هذه الموجة الجديدة المدارس والمؤسسات التجارية بشدة، تمامًا كما فعلت BA.1 التي أدت إلى غياب آلاف العمال عن أعمالهم."

يتم تذكير كبار السن وذوي الحالات الصحية الأساسية بالتحدث إلى طبيهيم العام أو أخصائي الصحة حول الأدوية المضادة للفيروسات إذا أصيبوا بـ COVID-19. تعمل مضادات الفيروسات بشكل أفضل عند استخدامها في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

يوصى بـ **جرعات معززة** من COVID-19 لأي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكبر ممن تلقوا آخر جرعة من دورة التطعيم الأولية قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

للمثور على أقرب عيادة تطعيم، تفضّل زيارة [nsw.gov.au](https://www.nsw.gov.au).