



**Brad Hazzard**  
Minister for Health

## 보도자료

2022년 7월 5일 화요일

### NSW 에 찾아온 최신 COVID-19 파동

Omicron BA.4 및 BA.5 하위 변종이 주도하는 현재의 감염 파동이 계속 커짐에 따라 NSW 모든 주민들께 COVID-19 예방 접종을 제때 맞고 COVID 로부터 안전한 행동을 실천하도록 부탁드립니다.

즉시 추가 접종을 하는 사람들이 늘고 COVID 로부터 안전한 행동을 실천하지 않는다면 중환자와 사망자의 숫자가 대폭 늘어날 것이라는 우려가 있습니다.

브래드 해자드 보건부 장관은 올해 COVID 관련 사망자의 56 퍼센트(1,232명)가 2회 이하 접종자인 것으로 집계되었다고 말했습니다.

"지금은 오미크론 삼차 파동의 시작점이며 오미크론 파동은 7월 말이나 8월 초에 최고조에 이를 것입니다." 지역 사회 감염이 증가하면 백신을 제때 맞지 않은 사람들의 발병 가능성도 대폭 증가합니다"라고 해자드 장관은 말했습니다.

"중병이나 그보다 심한 결과를 피할 수 있는 최상책은 맞을 수 있는 모든 백신을 맞는 것입니다."

국립 면역 연구 및 감시 센터(National Center for Immunization Research and Surveillance)의 데이터에 따르면 완전 예방 접종하면 백신 2차 접종 시 보다 오미크론으로 인한 입원이나 사망을 피할 가능성이 65 퍼센트 증가합니다.

닥터 케리 찬트 NSW 보건부 의무국장은 추가접종 예약에 덧붙여 사람들은 물리적 거리두기가 불가능한 경우 실내에서 마스크를 착용하는 등 상식적인 행동도 실천해야 한다고 말했습니다.

닥터 찬트는 "마스크, 손 위생, 아플 때 집에 머물기, 증상이 있을 때 스스로 테스트하기, 물리적 거리두기 등 이 모든 조치는 우리에게 새로운 것이 아닙니다"라고 말했습니다.

"우리가 다시 하나로 뭉치지 않으면 BA.1 파동 때 근로자 수천 명이 결근했던 것처럼 이번 파동도 학교와 사업체에 큰 타격을 줄 것입니다."

노인들과 기저 질환이 있는 사람들은 COVID-19에 감염될 경우 항바이러스제 복용 여부에 대해 가정의나 약사와 의논하시기 바랍니다. 항바이러스제는 증세가 나타나고 5일 안에 복용해야 가장 효과가 있습니다.

적어도 삼 개월 전에 이차 접종을 마친 16 세 이상자는 COVID-19 [추가 접종](#)을 권합니다.

근처 클리닉 위치를 아시고 싶으면, [nsw.gov.au](https://nsw.gov.au) 를 방문하십시오.

**언론 담당: 니콜렛 코멘디 | 해자드 장관 0429 064 897**