



Brad Hazzard
Minister for Health

แถลงข่าวสื่อมวลชน

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2022

NSW เผชิญคลื่น COVID-19 ล่าสุด

ขอให้ผู้อาศัยในรัฐ NSW ทุกคนตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 ของตนถูกต้อง และปฏิบัติตามพฤติกรรมความปลอดภัยจาก COVID เนื่องจากคลื่นโรคระบาดปัจจุบันซึ่งมีแรงผลักดันจากตัวแปรย่อย Omicron BA.4 และ BA.5 ยังคงขยายออกอย่างต่อเนื่อง

มีความเป็นไปได้ว่าจำนวนความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกเสียจากว่าประชาชนจำนวนมากขึ้นจะฉีดบูสเตอร์และปฏิบัติตามพฤติกรรมความปลอดภัยจาก COVID ในทันที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข Brad Hazzard กล่าวว่าตามตัวเลขระบุว่า 56 เปอร์เซ็นต์ (1,232) ของผู้เสียชีวิตด้วย COVID ในวันนี้ เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนสองเข็มหรือน้อยกว่า

“เราอยู่ที่จุดเริ่มต้นของคลื่นลูกที่สามของ Omicron ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสูงสุดในปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคม การแพร่ระบาดในชุมชนทำให้มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากแก่ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตรงตามกำหนดเวลา” รัฐมนตรี Hazzard กล่าว

“วิธีที่ดีที่สุดที่สามารถป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงหรือที่เลวร้ายยิ่งกว่า ได้แก่ฉีดวัคซีนทุกอย่างที่มีให้ฉีดได้”

หากท่านได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนก็เท่ากับว่าท่านมีการคุ้มกันมากกว่าถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ต่อการเจ็บป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาล หรือถึงขั้นเสียชีวิตจาก Omicron มากกว่าการฉีดวัคซีนเพียงสองเข็ม ตามข้อมูลของศูนย์วิจัยการสร้างภูมิคุ้มกันและการติดตาม

ผู้อำนวยการใหญ่แห่งการสาธารณสุข NSW แพทย์หญิง Kerry Chant กล่าวว่านอกจากทำนัดเพื่อฉีดบูสเตอร์แล้ว ผู้คนควรใช้สามัญสำนึกในการระมัดระวัง และใส่หน้ากากภายในสถานที่สาธารณะที่ไม่อาจอยู่ห่างกันได้

“หน้ากาก สวมหน้ากากอยู่บ้านเมื่อไม่สบาย ไปตรวจเมื่อมีอาการ อยู่ห่างกัน มาตรการเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่ของใหม่สำหรับเรา” แพทย์หญิง Chant กล่าว

“นอกจากว่าเราจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งอีกครั้ง คลื่นลูกใหม่นี้จะกระทบโรงเรียนและธุรกิจอย่างหนัก เหมือนกับที่ BA.1 ทำให้คนงานหลายพันคนขาดงาน”

ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ประจำตัว หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เกี่ยวกับยาต้านไวรัส ถ้าติดเชื้อ COVID-19 ยาต้านไวรัสมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าใช้ภายในห้าวันหลังจากที่มีอาการ

แนะนำ [วัคซีนบูสเตอร์ COVID-19](#) สำหรับผู้ที่อายุ 16 ปีขึ้นไปที่ฉีดเข็มสุดท้ายของชุดเริ่มต้นแล้วอย่างน้อยที่สุดสามเดือน

เพื่อหาคลินิกฉีดยาที่ใกล้ที่สุดดูที่ nsw.gov.au

สื่อมวลชน: Nicolette Kormendy | 0429 064 897