



COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) およびインフルエンザの重症化リスクがある方は早めに計画を

COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) およびインフルエンザが重症化する可能性が高いですか？

重症化リスクの高い方

- 60歳以上の方
- 妊娠中の女性
- アボリジニ、トレス海峡諸島民および太平洋諸島民
- 肥満、糖尿病、重篤な循環器疾患、慢性肺疾患 (過去12カ月以内に重篤な喘息で入院した人を含む)、重症慢性肝疾患／腎疾患、癌の治療中または免疫不全の方
- 肺、心臓あるいは免疫系に影響を及ぼす障害を含めて、障害のある方
- 高齢者介護施設および障害者施設の入所者
- 18歳以上のワクチン未接種者

具合が悪くなった場合、かかりつけ医が回復を早める抗ウイルス薬を推奨する場合があります。

具合が悪くなった場合、その薬を早急に服用する必要があります。

抗ウイルス薬の服用が適切かどうか、事前に医師に相談して計画を立ててください。

医療上の懸念があり、通訳を希望される方はTIS (TEL: 131 450) に電話して、NSW Health Flu and COVID-19 Care at Home Support Line (TEL: 1800 960 933) につなぐよう要請してください。

さらに詳しい情報をご希望の方は、ウェブサイト www.nsw.gov.au をご覧ください。