

ជំងឺកញ្ជ្រីល

ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មាន

Measles - Fact sheet

Khmer

ការពិតសំខាន់ៗ

- ជំងឺកញ្ជ្រីលគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយមេរោគដែលឆ្លងយ៉ាងខ្លាំង ដែលបណ្តាលឱ្យមានកន្ទួល និងគ្រុនក្តៅ។
- ជំងឺកញ្ជ្រីលអាចបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំងជំងឺរលាកសួត និងជំងឺរលាកខួរក្បាល ហើយអាចតម្រូវឱ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការបង្ការជំងឺ និងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកញ្ជ្រីល។ ជំងឺកញ្ជ្រីលកម្រកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ការជំងឺនេះ។
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រីលនៅតែមានសារៈសំខាន់ ពីព្រោះមនុស្សអាចនាំយកមេរោគមកវិញ បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីបរទេស។
- ជំងឺកញ្ជ្រីលនៅតែកើតមានជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន ដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីទៅលេងកម្សាន្ត ឬទៅជួបក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ។
- ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកមានជំងឺកញ្ជ្រីល សូមទូរសព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកជាមុន ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចកំណត់ការប៉ះពាល់របស់អ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតនៅពេលអ្នកមកដល់។

តើជំងឺកញ្ជ្រីលជាអ្វី?

ជំងឺកញ្ជ្រីលគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយមេរោគដែលឆ្លងយ៉ាងខ្លាំង ដែលអាចបង្កឱ្យមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ វានៅតែជាបុព្វហេតុទូទៅនៃការស្លាប់ក្នុងចំណោមកុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃពិភពលោក។ កាលពីកន្លងទៅ ការឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រីលកើតមានច្រើនទូទៅក្នុងកុមារភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ មនុស្សភាគច្រើនដែលកើតមុនឆ្នាំ 1966 នឹងឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រីលតាំងពីកុមារភាព ហើយទំនងជាមានភាពស្ងប់។

ដោយសារតែការចាក់ថ្នាំបង្ការ ជំងឺកញ្ជ្រីលត្រូវបានកម្រយើងមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជំងឺកញ្ជ្រីលនៅតែកើតមានជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោក ហើយការឆ្លងរាលដាលដ៏ធំនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន។ មនុស្សដែលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស ឬចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលី អាចនាំជំងឺនេះមកជាមួយពួកគេ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកញ្ជ្រីលនៅក្នុងសហគមន៍។ នេះជាមូលហេតុដែលវាសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រាកដថា អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រីលដើម្បីជួយការពារខ្លួនអ្នក និងសហគមន៍របស់អ្នក។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រាកដថានរណាម្នាក់ដែលកើតក្នុងអំឡុង ឬក្រោយឆ្នាំ 1966 បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រីលពីរដូស។

តើរោគសញ្ញានៃជំងឺកញ្ជីលមានអ្វីខ្លះ?

រោគសញ្ញាដំបូងគឺក្តៅខ្លួន អស់កម្លាំង ក្អក ហៀរសំបោរ ភ្នែកក្រហមដែលឈឺចាប់ ហើយមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន។ ពីរបីថ្ងៃក្រោយមកក៏លេចចេញកន្ទួល។ កន្ទួលចាប់ផ្តើមនៅលើមុខ រាលដាលចុះមករាងកាយ ហើយមានរយៈពេល 4-7 ថ្ងៃ។ កន្ទួលមិនរមាស់ទេ។ មនុស្សមួយចំនួន ជាពិសេសកុមារវ័យក្មេងក៏អាចមានរោគចុះរាគផងដែរ។

រោគសញ្ញានៃជំងឺកញ្ជីលជាធម្មតាចាប់ផ្តើម 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់នឹងវីរុស ប៉ុន្តែពេលខ្លះអាចចំណាយពេលដល់ទៅ 7 ឬច្រើនថ្ងៃរហូតដល់ 18 ថ្ងៃដើម្បីលេចឡើង។ ជាធម្មតា កន្ទួលលេចឡើងប្រហែល 14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់នឹងវីរុសជំងឺកញ្ជីល។

ជំងឺកញ្ជីលគឺជាជំងឺឆ្លងធម្មតា។ រហូតដល់មួយភាគបីនៃអ្នកកើតជំងឺកញ្ជីលមានផលវិបាកនានា ហើយមនុស្សជាច្រើនត្រូវការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។ ផលវិបាកនៃជំងឺកញ្ជីលអាចរួមមានដំបៅត្រចៀក រោគចុះរាគ និងជំងឺរលាកស្នូត។ មានមនុស្សប្រហែលមួយនាក់ក្នុងចំណោម 1000 នាក់ដែលមានជំងឺកញ្ជីល វិវត្តទៅជាជំងឺរលាកខួរក្បាល (ការហើមខួរក្បាល)។

តើជំងឺកញ្ជីលឆ្លងរាលដាលយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

ជាទូទៅ ជំងឺកញ្ជីលឆ្លងរាលដាលនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ស្រូបវីរុសជំងឺកញ្ជីលចូលតាមខ្យល់ដង្ហើម ដែលអ្នកឆ្លងបានក្អក ឬកណ្តាស់ទៅក្នុងខ្យល់។

ជំងឺកញ្ជីលគឺជាជំងឺឆ្លងដឹងាយស្រួលបំផុត ក្នុងចំណោមជំងឺឆ្លងទាំងអស់របស់មនុស្ស។ គ្រាន់តែនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយអ្នកដែលមានជំងឺកញ្ជីល ក៏អាចបណ្តាលឱ្យឆ្លងមេរោគនេះដែរ។

អ្នកដែលមានជំងឺកញ្ជីលជាធម្មតាឆ្លងមេរោគចាប់តាំងពីមុនពេលរោគសញ្ញាចាប់ផ្តើម រហូតដល់បួនថ្ងៃបន្ទាប់ពីកន្ទួលលេចឡើង។

តើអ្នកណាខ្លះដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកញ្ជីល?

មនុស្សប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកញ្ជីល ប្រសិនបើ៖

- ពួកគេមិនធ្លាប់ដែលបានឆ្លងមេរោគជំងឺកញ្ជីល ឬ
- ពួកគេមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជីលពីរដូស ឬ
- ពួកគេមានប្រព័ន្ធភាពសុំចុះខ្សោយ (ឧទាហរណ៍ អ្នកដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលដោយប្រើគីមី ឬការព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មសម្រាប់ជំងឺមហារីក ឬអ្នកដែលប្រើថ្នាំស្ត្រេប៉ូមីស្តីស៊ីតូស៊ីត) ទោះបីជាពួកគេបានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញ ឬធ្លាប់បានឆ្លងមេរោគជំងឺកញ្ជីលពីកន្លងមកក៏ដោយ **ហើយ**
- ពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលបានឆ្លងមេរោគជំងឺកញ្ជីល។

ជំងឺកញ្ជីលនៅតែកើតមានក្នុងប្រទេសជាច្រើន ហើយការផ្ទុះឡើងធំតែងតែកើតមាន។ អ្នកទៅក្រៅប្រទេសប្រឈមនឹងជំងឺកញ្ជីល ប្រសិនបើពួកគេមិនមានភាពសុំ។

តើគេអាចបង្ការជំងឺកញ្ជីលដោយរបៀបណា?

ការចាក់វ៉ាក់សាំង

ការគាំពារដ៏ល្អបំផុតដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺកញ្ជីលគឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង។ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជីលពីរដូស (យ៉ាងហោចណាស់បួនសប្តាហ៍ដាច់ពីគ្នា) ផ្តល់ការគាំពាររយៈពេលវែង អាចពេញមួយជីវិតក្នុង 99% នៃមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង។

អ្នកដែលមានគម្រោងចេញទៅក្រៅប្រទេសគួរតែនិយាយជាមួយ GP ឬឱសថការីរបស់ពួកគេអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង ពិនិត្យមើលថាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេទាន់បច្ចុប្បន្នភាព ហើយត្រូវប្រាកដថាពួកគេត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ ប្រឆាំងនឹងជំងឺកញ្ជ្រើល មុនពេលចាកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលី។

នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រើលពីរដូសត្រូវបានផ្តល់ឱ្យកុមារនៅក្រោមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការថ្នាក់ជាតិ (NIP) ដោយឥតគិតថ្លៃនោះ៖

- អាយុ 12 ខែ ជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រើល-ស្រឡាទែន-ស្ទូច (MMR)
- អាយុ 18 ខែ ជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រើល-ស្រឡាទែន-ស្ទូច- អុតធំ (MMRV)។

វ៉ាក់សាំងទាំងនេះផ្តល់ការគាំពារប្រឆាំងនឹងជំងឺស្រឡាទែន កញ្ជ្រើលអាឡឺម៉ង់ (ស្ទូច) និងអុតស្វាយ (អុតធំ) ក៏ដូចជាជំងឺ កញ្ជ្រើល។

អ្នកដែលមានគម្រោងចេញទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកុមារអាយុចន្លោះពី 6 ទៅ 18 ខែ គួរតែពិភាក្សាអំពីផែនការរបស់ពួកគេ ជាមួយ GP របស់ពួកគេ ពីព្រោះកុមារដែលទៅតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺកញ្ជ្រើល អាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រើល បានមុនពេល។

អ្នកដែលកើតក្នុងអំឡុង ឬក្រោយឆ្នាំ 1966 ដែលមិនធ្លាប់បានឆ្លងមេរោគជំងឺកញ្ជ្រើល គួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេ ដើម្បីប្រាកដថាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រើលពីរដូស យ៉ាងតិចបួនសប្តាហ៍ដាច់ពីគ្នា។ បើមិនដូច្នោះទេ វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងរដ្ឋ NSW។

វាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងលើសពីពីរដូស ដូច្នោះអ្នកដែលមិនច្បាស់ប្រាកដគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំង។

វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រើលអាចទទួលបាននៅក្នុងរដ្ឋ NSW ពីវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យរោគទូទៅ និងឱសថការីចាក់ថ្នាំបង្ការដែល បានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់។

ឱសថការីចាក់ថ្នាំបង្ការ មិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រើលដល់កុមារក្រោមអាយុ 5 ឆ្នាំបានទេ។

សម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលគ្មានភស្តុតាងនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រើលពីរដូស (មិនស្វែងរកវ៉ាក់សាំងនៅក្រោម NIP) វ៉ាក់សាំង ផ្ទាល់នឹងមិនគិតថ្លៃទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឱសថការី ឬវេជ្ជបណ្ឌិតអាចគិតថ្លៃសេវាកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល [សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់អំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រើល](#)។

ជៀសវាងអ្នកឯទៀត ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញា

អ្នកដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺកញ្ជ្រើលគួរតែទូរសព្ទជាមុន ពេលណាទៅកន្លែងថែទាំសុខភាព (ដូចជាផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬ GP) ដើម្បីជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកអំពីរោគសញ្ញារបស់ពួកគេ ដើម្បីដាក់ពួកគេឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅពេលមកដល់ ក្នុងគោលបំណងកំណត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកញ្ជ្រើលទៅអ្នកឯទៀត។

អ្នកដែលមានជំងឺកញ្ជ្រើលគួរតែស្នាក់នៅផ្ទះរហូតដល់ពួកគេលែងអាចចម្លងរោគ (ពោលគឺ រហូតដល់ទៅបួនថ្ងៃបន្ទាប់ពីកន្ទួល ចាប់ផ្តើម) ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងទៅមនុស្សឯទៀត។

តើជំងឺកញ្ជ្រើលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

ការសង្ស័យថាមានជំងឺកញ្ជ្រើល នៅពេលមនុស្សម្នាក់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ក្អក ហៀរសំបោរ ឬឈឺភ្នែក និងគ្រុនក្តៅ បន្ទាប់មកកើតមានកន្ទួល។

នៅពេលណាមានការសង្ស័យថាមានជំងឺកញ្ជ្រើល គួរតែប្រមូលសំណាកពីច្រមុះ បំពង់ក និងទឹកនោម ដើម្បីបញ្ជាក់ពី រោគវិនិច្ឆ័យ។ ការធ្វើតេស្តឈាមក៏អាចត្រូវបានអនុវត្តផងដែរ។

ការបញ្ជាក់នៃរោគវិនិច្ឆ័យមានសារៈសំខាន់ ពីព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យមានការតាមដានសុខភាពសាធារណៈភ្លាមៗ អំពីមនុស្សឯទៀតដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រើល។

តើជំងឺកញ្ជ្រើលត្រូវបានព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

មិនមានការព្យាបាលជាក់លាក់សម្រាប់ជំងឺកញ្ជ្រើលទេ។ ជាធម្មតា អ្នកដែលបានឆ្លងមេរោគជំងឺកញ្ជ្រើល ត្រូវបានណែនាំឱ្យសម្រាក ផឹកទឹកឱ្យបានច្រើន និងលេបថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា ដើម្បីព្យាបាលគ្រុនក្តៅ។

សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន ជំងឺអាចនឹងទៅជាធ្ងន់ធ្ងររហូតទាល់តែតម្រូវការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។

តើមានវិធានការឆ្លើយតបសុខភាពសាធារណៈអ្វីខ្លះចំពោះជំងឺកញ្ជ្រើល?

វេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរពេទ្យ និងមន្ទីរពិសោធន៍ សាលារៀន និងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ត្រូវតែជូនដំណឹងអំពីករណីនៃជំងឺកញ្ជ្រើលទៅកាន់អង្គភាពសុខភាពសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋាន។

បុគ្គលិកអង្គភាពសុខភាពសាធារណៈនឹងសម្ភាសវេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកជម្ងឺ (ឬអ្នកថែទាំ) ដើម្បីស្វែងយល់ពីការឆ្លងមេរោគដែលបានកើតឡើង កំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សទៀតដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគ អនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យ (ដូចជាការចាក់ថ្នាំបង្ការ និងការវិវត្តលើការទៅសាលារៀន ឬការងារ) និងផ្តល់ជំនួយផ្សេងទៀត។

អ្នកដែលមានជំងឺកញ្ជ្រើលគួរតែស្នាក់នៅផ្ទះ ហើយមិនត្រូវទៅធ្វើការ សាលារៀន ឬសេវាកម្មអប់រំ និងថែទាំកុមារតូចយ៉ាងហោចណាស់ 4 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកន្លងលេចឡើង។

ជំងឺកញ្ជ្រើល ៖ ទម្រង់បែបបទព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនង មានព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រូពេទ្យដើម្បីផ្តល់ដល់អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយជំងឺកញ្ជ្រើល បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃ និង/ឬការផ្តល់ការការពារក្រោយពីបានប៉ះពាល់នឹងមេរោគ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរសព្ទទៅអង្គភាពសុខភាពសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតាមលេខ 1300 066 055។

ប្រសិនបើអ្នក ឬកូនរបស់អ្នកមានរោគសញ្ញានៃជំងឺកញ្ជ្រើល ហើយអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ សូមពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកភ្លាមៗ ឬក្នុងគ្រាអាសន្នហៅទូរសព្ទលេខ 000។ សម្រាប់ការណែនាំអំពីសុខភាព អ្នកអាចទូរសព្ទទៅ Healthdirect តាមលេខ 1800 022 222 សម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសុខភាព 24 ម៉ោងដោយឥតគិតថ្លៃ ឬនិយាយទៅកាន់ឱសថការីក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។