

ໂຮກຫັດ

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນຂໍ້ເທັດຈິງ

Measles - Fact sheet

Lao

ຂໍ້ເທັດຈິງສໍາຄັນ

- ໂຮກຫັດເປັນໂຮກຕິດຕໍ່ທີ່ມີໄວຣັສທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຕຸ່ມຜິ້ນ ແລະ ເປັນໄຂ້.
- ໂຮກຫັດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແຊກຊ້ອນຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ ປອດອັກເສບ ແລະ ສະໝອງອັກເສບ ແລະ ອາດຕ້ອງເຂົ້າຮັບການຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍ.
- ການສັກວັກຊີນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນໂຮກ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຮກຫັດ. ໂຮກຫັດແມ່ນພົບໄດ້ນ້ອຍໃນອອສເຕຣເລຍ ເນື່ອງຈາກວ່າວັກຊີນມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນໂຮກ.
- ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຫັດຍັງຄົງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ເພາະວ່າຄົນເຮົາສາມາດນໍາເອົາເຊື້ອໄວຣັສກັບຄືນມາໄດ້ພາຍຫຼັງທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ.
- ໂຮກຫັດແມ່ນຍັງພົບໄດ້ທົ່ວໄປໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ຊາວອອສເຕຣເລຍໄປທ່ຽວພັກຜ່ອນ ຫຼື ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ.
- ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານເປັນໂຮກຫັດ ໃຫ້ໂທຫາທ່ານໝໍລ່ວງໜ້າເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝໍສາມາດຈຳກັດການສຳຜັດກັບຄົນອື່ນເມື່ອທ່ານມາຮອດ.

ໂຮກຫັດແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກຫັດເປັນໂຮກທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ໄວທີ່ສຸດແລະອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແຊກຊ້ອນຮ້າຍແຮງໄດ້. ມັນຍັງຄົງເປັນສາເຫດຂອງການເສັຍຊີວິດທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີຢູ່ໃນບາງສ່ວນຂອງໂລກ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການຕິດເຊື້ອໂຮກຫັດແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນວັຍເດັກໃນອອສເຕຣເລຍ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເກີດກ່ອນປີ 1966 ຈະຕິດເຊື້ອໂຮກຫັດໃນວັຍເດັກ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີພູມຄຸ້ມກັນ.

ເນື່ອງຈາກມີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ໃນປັດຈຸບັນໂຮກຫັດຈຶ່ງພົບໄດ້ໜ້ອຍໃນອອສເຕຣເລຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຮກຫັດຍັງຄົງພົບໄດ້ທົ່ວໄປໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງໂລກ ແລະ ການລະບາດໃຫຍ່ຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາຍປະເທດ. ຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເດີນທາງມາອອສເຕຣເລຍອາດນໍາເອົາໂຮກນີ້ມານໍາໄດ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງໂຮກຫັດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຫັດ ເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຜູ້ທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງປີ 1966 ຫຼື ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ຮັບວັກຊີນໂຮກຫັດສອງເຂັມ.

ອາການຂອງໂຮກຫັດມີຫຍັງແດ່?

ອາການທຳອິດແມ່ນເປັນໄຂ້, ເມື່ອຍ, ໄອ, ນ້ຳມູກໄຫຼ, ຕາແດງແລະເຈັບ ແລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຕົວ. ສອງສາມມື້ຕໍ່ມາຈະມີຕຸ່ມຜິ່ນປາກົດຂຶ້ນ. ຜິ່ນຈະເລີ່ມຂຶ້ນເທິງໃບໜ້າ, ແຜ່ລາມລົງໄປເຖິງລຳຕົວ ແລະ ເປັນຢູ່ປະມານ 4-7 ວັນ. ຜິ່ນຈະບໍ່ມີອາການຄັນ. ບາງຄົນ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ, ອາດຈະມີອາການຖອກທ້ອງອີກນຳ.

ອາການຂອງໂຮກຫັດມັກຈະເລີ່ມປາກົດປະມານ 10 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ສຳຜັດກັບໄວຣັສ ແຕ່ບາງຄັ້ງອາດໃຊ້ເວລາປະມານ 7 ຫຼື ດົນເຖິງ 18 ມື້ຈຶ່ງຈະປາກົດ. ປົກກະຕິແລ້ວຕຸ່ມຜິ່ນຈະປາກົດຂຶ້ນປະມານ 14 ມື້ຫຼັງຈາກການສຳຜັດກັບເຊື້ອໄວຣັສໂຮກຫັດ.

ໂຮກຫັດເປັນໂຮກຮ້າຍແຮງ. ຄົນທີ່ເປັນໂຮກຫັດຫຼາຍເຖິງ ໜຶ່ງໃນສາມ ຈະມີອາການແຊກຊ້ອນ ແລະ ຫຼາຍຄົນຕ້ອງເຂົ້າຮັບການຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍ. ອາການແຊກຊ້ອນຂອງໂຮກຫັດອາດປະກອບມີການຕິດເຊື້ອໃນຫູ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ປອດອັກເສບ. ປະມານໜຶ່ງໃນທຸກໆ 1000 ຄົນທີ່ເປັນໂຮກຫັດຈະພັດທະນາເປັນສະໝອງອັກເສບ (ອາການບວມຂອງສະໝອງ).

ໂຮກຫັດແຜ່ຜ່າຍໄດ້ແນວໃດ?

ໂຮກຫັດມັກຈະແຜ່ຜ່າຍໄປເມື່ອຄົນຫາຍໃຈເອົາເຊື້ອໄວຣັສໂຮກຫັດທີ່ເກີດຈາກອາການໄອ ຫຼື ຈາມຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ຢູ່ໃນອາກາດ.

ໂຮກຫັດແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຮກຕິດເຊື້ອທີ່ແຜ່ລາມໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດໃນບັນດາໂຮກຕິດເຊື້ອຂອງມະນຸດທັງໝົດ. ພຽງແຕ່ການຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວກັນກັບຄົນທີ່ເປັນໂຮກຫັດກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອໄດ້.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄົນທີ່ເປັນໂຮກຫັດແມ່ນມັກຈະຕິດເຊື້ອຕັ້ງແຕ່ກ່ອນອາການຈະເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງສິ້ນສຸດຂອງຜິ່ນປາກົດຂຶ້ນ.

ໃຜແດ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຮກຫັດ?

ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຮກຫັດຖ້າ:

- ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍມີການຕິດເຊື້ອໂຮກຫັດມາກ່ອນ ຫຼື
- ພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຫັດ 2 ເຂັມ ຫຼື
- ພວກເຂົາມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນທີ່ອ່ອນແອ (ເຊັ່ນ: ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ ຫຼື ດ້ວຍລັງສີສຳລັບໂຮກມະເຮັງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຢາສະເຕີຣອຍໃນປະລິມານສູງ) ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຫຼື ເຄີຍຕິດເຊື້ອຫັດມາກ່ອນແລ້ວກໍ່ຕາມ ແລະ
- ພວກເຂົາໄດ້ເຄີຍສຳຜັດກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຮກຫັດ.

ໂຮກຫັດຍັງພົບໄດ້ທົ່ວໄປຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ ແລະ ການລະບາດໃຫຍ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຜູ້ທີ່ໄປຕ່າງປະເທດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໂຮກຫັດ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ມີພູມຄຸ້ມກັນ.

ຈະປ້ອງກັນໂຮກຫັດໄດ້ແນວໃດ?

ການສັກຢາປ້ອງກັນ

ການປ້ອງກັນໂຮກຫັດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການສັກວັກຊີນ. ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຫັດສອງເຂັມ (ຫ່າງກັນຢ່າງ ໜ້ອຍ 4 ອາທິດ) ຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນໃນໄລຍະຍາວ, ອາດຕະຫຼອດຊີວິດໃນ 99% ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ.

ຜູ້ທີ່ວາງແຜນຈະໄປຕ່າງປະເທດຄວນໂອ້ລົມກັບທ່ານໝໍຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ເພສັດຊາອນກ່ຽວກັບການສັກວັກຊີນ, ກວດເບິ່ງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນຄົບຖ້ວນແລ້ວ ແລະ ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຫັດຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະອອກຈາກອອສເຕຣເລຍ.

ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຫັດ 2 ເຂັມ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆພາຍໃຕ້ໂຄງການການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ແຫ່ງຊາດ (NIP) ຕອນ:

- ອາຍຸ 12 ເດືອນ ສັກວັກຊີນໂຮກຫັດ-ໂຮກ ໝາກເບີດ-ໂຮກຫັດເຢີຍຣະມັນ(ຮູແບລລາ) (MMR).
- ອາຍຸ 18 ເດືອນ ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຫັດ-ໂຮກໝາກເບີດ-ໂຮກຫັດເຢີຍຣະມັນ -ໂຮກໝາກໃສ (MMRV).

ວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນຈາກໂຮກໝາກເບີດ, ໂຮກຫັດເຢີຍລະມັນ(ຮູແບລລາ) ແລະ ໂຮກໝາກໃສ (ວາຣີແຊລລາ) ລວມເຖິງໂຮກຫັດອີກດ້ວຍ.

ຜູ້ທີ່ວາງແຜນຈະໄປຕ່າງປະເທດກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ຫາ 18 ເດືອນຄວນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຂອງພວກເຂົາກັບທ່ານໝໍຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ເນື່ອງຈາກວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ເດີນທາງໄປເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ໂຮກຫັດສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຫັດແຕ່ຕົ້ນໆ.

ຜູ້ໃດທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງ ປີ 1966 ຫຼື ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຕິດເຊື້ອໂຮກຫັດມາກ່ອນຄວນໄປພົບທ່ານໝໍເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຮກຫັດຄົບສອງເຂັມຢ່າງໜ້ອຍເວັ້ນລະຍະຫ່າງ 4 ອາທິດ. ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ ກໍສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃນ ຣັດ NSW.

ການສັກວັກຊີນຫຼາຍກວ່າສອງເຂັມກໍມີຄວາມປອດໄພ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ທີ່ບໍ່ແນ່ໃຈກໍຄວນໄປຮັບການສັກວັກຊີນ.

ໃນຣັດ NSW ສາມາດຮັບວັກຊີນໂຮກຫັດຈາກທ່ານໝໍທົ່ວໄປ ແລະ ເພສັດຊກອນດ້ານສັກຢາກັນໂຮກທີ່ລົງທະບຽນ.

ເພສັດຊກອນດ້ານສັກຢາກັນໂຮກບໍ່ສາມາດໃຫ້ວັກຊີນໂຮກຫັດແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີໄດ້.

ສໍາລັບໃຜທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານການສັກວັກຊີນໂຮກຫັດຄົບສອງເຂັມ (ບໍ່ໄດ້ຂໍຮັບວັກຊີນພາຍໃຕ້ NIP) ວັກຊີນຈະແມ່ນຟຣີ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພສັດຊກອນ ຫຼື ທ່ານໝໍອາດຈະຄິດຄ່າບໍລິການໃນການສັກວັກຊີນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເບິ່ງ [ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຫັດ](#).

ຫຼີກລ້ຽງການສໍາຜັດຜູ້ອື່ນຖ້າທ່ານມີອາການ

ຜູ້ທີ່ມີອາການຂອງໂຮກຫັດຄວນໂທແຈ້ງລ່ວງໜ້າໃນເວລາໄປຮັບການຮັກສາຕາມສະຖານທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ພະແນກສຸກເສີນ ຫຼື ທ່ານໝໍ), ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ອາການ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດແຍກໂຕເມື່ອມາຮອດເພື່ອຈໍາກັດການແຜ່ລະບາດຂອງໂຮກຫັດໄປໃຫ້ຜູ້ອື່ນ.

ຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກຫັດຄວນຢູ່ເຮືອນຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ແຜ່ເຊື້ອອີກຕໍ່ໄປ (ເຊັ່ນ: ຈົນກວ່າຈະຜ່ານສີ່ມືຫຼັງຈາກຜິ່ນເລີ່ມຂຶ້ນ) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະແຜ່ລາມໄປຫາຜູ້ອື່ນ.

ໂຮກຫັດໄດ້ຮັບການວິນິດໄສແນວໃດ?

ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຈະຖືກສົງໄສວ່າເປັນໂຮກຫັດ ເມື່ອລາວຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ, ໄອ, ນໍ້າມູກໄຫຼ ຫຼື ເຈັບຕາ ແລະ ມີອາການໄຂ້ຕາມມາດ້ວຍຕຸ່ມຜິ່ນ.

ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ສົງໄສວ່າເປັນໂຮກຫັດ, ຄວນເກັບຕົວຢ່າງຈາກດັງ, ຄໍ, ແລະ ປັດສະວະເພື່ອຢືນຢັນການວິນິດໄສ. ອາດມີການກວດເລືອດອີກນໍ້າ.

ການຢືນຢັນການວິນິດໄສແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິການອະນາໄມຊຸມຊົນສາມາດຕິດຕາມດູແລຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຮກຫັດ ໄດ້ໃນທັນທີ.

ໂຮກຫັດປິ່ນປົວແນວໃດ?

ບໍ່ມີການປິ່ນປົວສະເພາະສໍາລັບໂຮກຫັດ. ປົກກະຕິຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກຫັດຈະຖືກແນະນໍາໃຫ້ພັກຜ່ອນ, ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ ແລະ ກິນຢາພາຣາເຊຕາມອລເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການໄຂ້.

ສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ, ໂຮກອາດຈະຮ້າຍແຮງຈົນຈະຕ້ອງເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ.

ການຕອບຮັບດ້ານສາທາລະນະສຸກຕໍ່ໂຮກຫັດແມ່ນຫຍັງແດ່?

ທ່ານໝໍ, ໂຮງໝໍ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ, ໂຮງຮຽນ, ແລະ ສູນດູແລເດັກຕ້ອງແຈ້ງກໍລະນີຂອງຜູ້ເປັນໂຮກຫັດໃຫ້ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຊາບ.

ພະນັກງານຂອງພະແນກບໍລິການສາທາລະນະສຸກຈະສໍາພາດທ່ານໝໍແລະຄົນເຈັບ (ຫຼືຜູ້ດູແລ) ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດຂອງການຕິດເຊື້ອ, ລະບຸຜູ້ອື່ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ, ປະຕິບັດມາດຕາການຄວບຄຸມ (ເຊັ່ນ: ການສັກຢາປ້ອງກັນແລະຂີ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼືເຮັດວຽກ), ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາອື່ນໆ.

ຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກຫັດຄວນຢູ່ເຮືອນ ແລະ ບໍ່ໄປເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່ຮັບລ້ຽງເດັກເປັນເວລາຢ່າງ ໜ້ອຍສີ່ຫຼັງຈາກຜິ່ນແດງປາກົດຂຶ້ນ.

ໂຮກຫັດ: ແບບຟອມຂໍ້ມູນສໍາລັບຜູ້ສໍາຜັດໂຮກຫັດ ມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທ່ານໝໍເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຜູ້ສໍາຜັດໂຮກຫັດ, ການຕິດຕາມການປະເມີນ ແລະ/ຫຼື ການສະໜອງການປ້ອງກັນຫຼັງການສໍາຜັດໂຮກ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາໂທຫາ ໜ່ວຍງານບໍລິການສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ທີ່ເບີ 1300 066 055.

ຖ້າທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານມີອາການຂອງໂຮກຫັດ ແລະ ທ່ານມີຄວາມກັງວົນ ໃຫ້ເວົ້າລົມກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານທັນທີ ຫຼື ໃນກໍລະນີສຸກເສີນໃຫ້ໂທເບີ 000. ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາດ້ານສຸຂະພາບ ທ່ານຍັງສາມາດໂທຫາ Healthdirect ໄດ້ທີ່ເບີ 1800 022 222 ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາດ້ານສຸຂະພາບຟຣີ ຕລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ໂອ້ລົມກັບເພສັດຊາອນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.