

Monitoramento por raio-X de tórax para tuberculose (TB)

Chest x-ray monitoring for tuberculosis (TB)

Portuguese

O que é monitoramento por raio-X de tórax, e por que preciso dele?

Seu médico talvez lhe peça para fazer raios-X de tórax com regularidade para monitorar a tuberculose (TB). Estes raios-X ajudam a verificar se há mudanças em seus pulmões.

Os raios-X de tórax são usados para:

- ver se a infecção por TB se transformou na doença da TB.
- verificar se a doença da TB está melhorando com a medicação.

Raios-X são prejudiciais?

Os raios-X usam uma pequena quantidade de radiação. A quantidade de radiação em um raio-X é como a exposição à radiação durante um voo longo de avião. Esta quantidade de radiação é considerada segura, mesmo se você fizer vários raios-X.

Se há alguma chance de você estar grávida, é importante avisar o médico antes do raio-X. O médico conversará com você sobre se deve esperar para fazer o raio-X depois do parto. Se precisar de um raio-X enquanto estiver grávida, pediremos que você use um avental de chumbo especial para proteger o bebê.

Mães que estão amamentando podem amamentar seus bebês com segurança, sem risco para o leite ou para o bebê.

O que acontece quando faço um raio-X de tórax?

Um radiologista faz o raio-X em você. O radiologista pode lhe pedir para retirar suas joias ou colocar um avental / uma bata de paciente antes de fazer o seu raio-X. Se desejar ter um acompanhante na sala, por favor, peça ao radiologista.

Leva apenas alguns segundos para fazer um raio-X. Enquanto o raio-X é feito, você deverá inspirar fundo e permanecer imóvel.

Se estiver indo a uma clínica para TB ou clínica de tórax, avise-os quando e onde fez seu último raio-X.

O filme do raio-X será enviado ao seu médico. O médico irá comparar o filme com seus raios-X anteriores, para ver se houve mudanças em seus pulmões. Isto pode demorar algum tempo. Sua clínica entrará em contato com você se houver mudanças em seus pulmões e se você precisar ir ao médico novamente.

Por quanto tempo precisarei do monitoramento por raio-X de tórax?

A maioria das pessoas faz raios-X de tórax a cada 6-12 meses. Se não houver nenhuma mudança nos seus raios-X durante 2-3 anos, talvez seu médico decida que você não precisa mais do monitoramento por raio-X de tórax. Se tiver dúvidas ou preocupações, por favor, converse sobre elas com seu médico.

Mais informações

Para mais informações sobre TB, consulte health.nsw.gov.au/tb

Para ajuda gratuita em sua língua, ligue para o Serviço de Tradutores e Intérpretes (TIS), no número 13 14 50.