

ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧/August 2007
 SHPN (CBD) 07/136KH (Khmer)

**កិច្ចបំរើគ្រប់គ្រង និងការពារជម្ងឺរបេង រដ្ឋញូវសៅវែល
 NSW Tuberculosis Prevention & Control Service**

រោគរបេងដែលមិនទាន់លេចចេញឲ្យឃើញ (LTBI) និងការព្យាបាលដើម្បីបង្ការរោគ

- វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកបានចេញនូវមុខងារពេទ្យជូនលោកអ្នក ដើម្បីបង្ការរោគរបេង (TB)។
- ការព្យាបាលនេះបានផ្តល់ជូនលោកអ្នកដោយព្រោះថាលោកអ្នកមាន៖
 - ការធ្វើតេស្តស្បែកវិជ្ជមានដើម្បីរកមើលរោគរបេង (បានគេហៅដែរថាតេស្ត TST ឬតេស្ត Mantoux) ឬ
 - ការថតមើលដើមទ្រូងដោយកម្មវិធីអិក្សូ ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញភាពខុសប្រក្រតី ឬ
 - ធ្លាប់បានទាក់ទងជាមួយជនណាម្នាក់ដែលមានរោគ TB។
- ការទាំងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកអ្នកទំនងជាមានរោគ TB ដែលអាចនាំឲ្យកើតទៅជាជម្ងឺរបេង។

តើរោគ TB និងជម្ងឺ TB ខុសពីគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

រោគ TB:

- ការមាន TST វិជ្ជមាន បញ្ជាក់ថាមានរោគ TB។
- កាលណាជនណាម្នាក់មានរោគ TB នោះគេមានមេរោគ TB នៅក្នុងដងខ្លួនរបស់គេ ក៏ប៉ុន្តែមេរោគទាំងនោះមិនសកម្មឡើយ ហើយក៏មិនអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃបានទេ។
- នៅក្នុងករណីភាគច្រើន (៩០-៩៥%នៃប្រជាជន) ប្រព័ន្ធស៊ាំនឹងរោគរបេងរបស់ដងខ្លួនគ្រប់គ្រងមេរោគទាំងនោះ ហើយជម្ងឺ TB នឹងមិនអាចកើតបានឡើយ។
- អស់អ្នកដែលមានរោគ TB តែមួយមុខនោះពុំមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ ហើយគេមានអារម្មណ៍ល្អទេ។

ជម្ងឺ TB:

- នៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណជា៥-១០% ដែលមានរោគ TB ជម្ងឺ TB អាចកើតមានឡើងពេលណាមេរោគ TB អសកម្ម ក្លាយទៅជាសកម្ម ហើយកើនចំនួនរបស់វា។
- ការនេះអាចកើតមានឡើងទោះបីជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកក្តី តាមធម្មតាពេលណាប្រព័ន្ធស៊ាំនឹងរោគរបេងរបស់ដងខ្លួនវាខ្សោយ។ ការនេះអាចកើតមានឡើងដោយព្រោះតែចូលរយៈពេលវែង មានជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ ប្រើគ្រឿងញៀន ឬសុរា មានរោគ HIV (មេរោគដែលបណ្តាលឲ្យកើតជម្ងឺអេដស៍) ឬលក្ខណៈរោគដទៃទៀត។

រោគ TB	ជម្ងឺ TB
មានមេរោគ TB អសកម្មនៅក្នុងដងខ្លួន	មានមេរោគ TB សកម្មនៅក្នុងដងខ្លួន
គឺមានរោគសញ្ញានៃ TB	មានរោគសញ្ញានៃ TB ទាំងឡាយមានដូចជាក្អក ក្រិន ស្រកទម្ងន់
មិនអាចចម្លងមេរោគ TB ទៅអ្នកដទៃបានទេ	អាចចម្លងមេរោគ TB ទៅអ្នកដទៃបាន
អាចត្រូវការការព្យាបាលរោគ TB ដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតក្លាយទៅជាជម្ងឺ TB	ត្រូវទទួលការព្យាបាលដើម្បីឲ្យបានជាជម្ងឺ TB

តើមានការព្យាបាលណាខ្លះសំរាប់រោគ TB?

- ថ្នាំព្យាបាលធម្មតាប្រើសំរាប់ការពាររោគ TB គឺ Isoniazid ក៏ប៉ុន្តែគេអាចប្រើថ្នាំព្យាបាលដទៃទៀតផងដែរ។
- ត្រូវលេបថ្នាំព្យាបាលទាំងនេះរៀងរាល់ថ្ងៃ ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់៦ខែ ដ្បិតអីវ៉ាត្រូវការរយៈពេលវែងយ៉ាងនេះ ដើម្បីសម្លាប់មេរោគ TB អស់កម្ម។
- លោកអ្នកប្រហែលជាបានទទួលថ្នាំព្យាបាល pyridoxine (វីតាមីន B6) ដើម្បីបង្ការប្រតិកម្មរាងកាយដែលអាចកើតមាននៃថ្នាំ Isoniazid។

ខ្ញុំមិនឈឺទេ តើខ្ញុំត្រូវលេបថ្នាំដែរឬទេ?

- ទោះបីជាលោកអ្នកមិនឈឺក្តី ការព្យាបាលរោគ TB នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអាចសម្លាប់មេរោគ TB ដែលមាននៅក្នុងដងខ្លួនរបស់លោកអ្នក ហើយជួយការពារលោកអ្នកឲ្យរួចផុតពីការកើតមាននៃជម្ងឺ TB។
- ការព្យាបាលរោគ TB អាចជួយបង្ការជម្ងឺ TB នៅក្នុងចំនួនមនុស្សភាគច្រើនដែលបញ្ចប់ការប្រើថ្នាំព្យាបាលលេញលេញ។

តើការព្យាបាលរោគ TB មានសុវត្ថិភាពឬទេ?

- ថ្នាំព្យាបាលទាំងនេះមានសុវត្ថិភាព ហើយមនុស្សភាគច្រើន (មានរួមទាំងកុមារ) ពុំមានបទពិសោធន៍នឹងបញ្ហាណាមួយឡើយ ពេលណាគេប្រើថ្នាំទាំងនេះ។
- អ្នកខ្លះអាចមានប្រតិកម្មរាងកាយទាំងឡាយ មានរួមទាំង៖
 - ឈឺពោះ
 - ស្បែក ឬភ្នែកលឿង
 - ទឹកមាត់ពណ៌ខ្មៅ (ដូចតែខ្មៅ ឬកាហ្វេខ្មៅ)
 - លែងចង់ពិសាម្ហូបអាហារ
 - វិលមុខ ឬចង់ក្អក
 - ឡើងកន្ទួល ឬរមាស់
 - គ្រុន
 - អស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំង
 - ឈឺធ្មេញនៅត្រង់ម្រាមដៃ ឬម្រាមជើង។

សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋាករបស់លោកអ្នកឲ្យបានភ្លាម ប្រសិនបើលោកអ្នកមានប្រតិកម្មរាងកាយទាំងនេះណាមួយ ឬប្រតិកម្មរាងកាយដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមានកង្វល់។ ប្រតិកម្មរាងកាយមួយដែលកម្រនឹងឃើញមាន ក៏ប៉ុន្តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរគឺការខូចថ្លើម ហើយជាទូទៅការនេះអាចចៀសវាងបាន ដោយមានការពិនិត្យឃើញមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។

តើខ្ញុំគួរប្រើថ្នាំពេទ្យដោយបែបណា?

- លោកអ្នកគួរលេបថ្នាំពេទ្យទាំងអស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នា ឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃ។
- ដើម្បីជួយលោកអ្នកឲ្យបានចាំក្នុងការលេបថ្នាំពេទ្យរបស់លោកអ្នក លោកអ្នកអាចយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ដោយគូសសញ្ញាសំគាល់នៅលើប្រក្រតិទិន ឬសៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក ឬលេបថ្នាំពេទ្យរបស់លោកអ្នកមួយម៉ោងមុនពេលពិសាម្ហូបអាហារណាមួយរបស់លោកអ្នក។

- ប្រសិនបើលោកអ្នកភ្លេចលេបថ្នាំរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃណាមួយ សូមគ្រាន់តែលេបកម្រិតថ្នាំធម្មតានៅថ្ងៃបន្ទាប់ ទៀតប៉ុណ្ណោះ (ក៏ប៉ុន្តែកុំលេបកម្រិតថ្នាំខ្លាំងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឲ្យសោះ)។ ប្រសិនបើលោកអ្នកភ្លេចលេបច្រើនដងពេក ថ្នាំនោះប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនឹងសម្រាប់មេរោគ TB ទាំងអស់ឡើយ។ លោកអ្នកគួរប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋាករបស់លោកអ្នកឲ្យបានដឹង ប្រសិនបើលោកអ្នកចេះតែភ្លេចលេបថ្នាំរបស់លោកអ្នក។
- លោកអ្នកមិនគួរពិសាសុរាឡើយ ក្នុងកាលកំពុងលេបថ្នាំពេទ្យរបស់លោកអ្នក។ សូមឆែកមើលជាមួយវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក មុននឹងលោកអ្នកលេបថ្នាំព្យាបាលថ្មីណាមួយ (មានរួមទាំងថ្នាំទិញពីឱសថស្ថានដោយ ឥតមានសំបុត្រពេទ្យ ឬថ្នាំបន្ថែមណាមួយ ដូចជាថ្នាំផ្សិតស៊ីតាម៉ូល) ដ្បិតថ្នាំខ្លះប៉ះពាល់ដល់ថ្នាំពេទ្យទៀត ប្រើសំរាប់បង្ការមេរោគ TB។

តើខ្ញុំត្រូវប្រាប់ធនាគារម្នាក់ឬទេ អំពីថ្នាំព្យាបាលមេរោគ TB របស់ខ្ញុំ?

- អស់អ្នកដែលមានមេរោគ TB តែមួយមុខនោះមិនអាចចម្លងមេរោគ TB ទៅអ្នកផ្សេងទៀតឡើយ ដូច្នោះមិនចាំបាច់ ប្រាប់អ្នកដទៃទៀតនៅកន្លែងធ្វើការ សាលារៀន ឬសាកលវិទ្យាល័យឡើយ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ធ្វើយ៉ាង ដូច្នោះ។ លោកអ្នកគួរប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតដទៃទៀតដែលលោកអ្នកទៅជួប ហើយគេនឹងរក្សាទុកព័ត៌មាននេះជា សម្ងាត់។

កិច្ចការងារទៀតដែលត្រូវពិចារណា

ក្រៅពីកិច្ចការដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ:

- អ្នកគួរប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដទៃទៀត ឬអ្នកមានបំណងចង់មានផ្ទៃពោះ។
- លោកអ្នកអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពធម្មតាទាំងឡាយរបស់លោកអ្នក ក្នុងកាលកំពុងលេបថ្នាំពេទ្យនេះ។

ដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានច្រើនថែមទៀត

- ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ្នកកំពុងលេបថ្នាំពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋាកនឹងពិនិត្យមើលលោកអ្នកយ៉ាង ទៀងទាត់ដើម្បីឆែកមើលដំណើរជាគ្រាន់បើឡើងវិញរបស់លោកអ្នក ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណង ចង់ទទួលយកព័ត៌មានច្រើនថែមទៀត សូមទាក់ទងជាមួយគិលានុបដ្ឋាកថតពិនិត្យមើលដើមទ្រូងប្រចាំតំបន់ របស់លោកអ្នក ឬទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំតំបន់របស់លោកអ្នក។