

الاستجابة الإسعافية لجرعة أوبيويد زائدة

اتبع الخطوات التالية لبخاخ Nyxoid الأنفي

2

جرعة أوبيويد زائدة؟ تفقد العلامات

- لا توجد استجابة
- البؤبؤان لا يتحركان
- يتنفس بشكل غير طبيعي - تنفسه سطحي وبطيء أو يشخر
- جلده شاحب أو بارد، وشفته وأطراف أصابعه زرقاء أو رمادية اللون



1

السلامة

تفقد سلامة الشخص
وأمان المكان.



4

اقلب الشخص على ظهره

اجعله يستلقي على ظهره وتحقق من
عدم وجود عائق لدخول الهواء إلى أنفه.



3

اتصل على ثلاثة أصفار (000)


أعتقد أنها جرعة
زائدة (overdose)



7

هل يتنفس؟

إذا لم يكن يتنفس،
استخدم تنفس الإسعاف
إذا كنت تعرف الطريقة
- انفخ في فمه نفسين.



6

اعطِ NALOXONE في الأنف


أدخِل فوهة Nyxoid® في
فتحة الأنف.
اضغط لحين أن تسمع طقّة
كي تعطي الجرعة.



5

امسك NYXOID هكذا

تذكّر أن Nyxoid® يحتوي
على جرعة واحدة فقط.



9

كرّر الجرعة إذا لزم الأمر

إذا لم يستجب، اعطه جرعة ثانية
من Nyxoid® في فتحة الأنف الثانية.
إذا توفّرت، اعطه جرعة أخرى مرة كل دقيقتين
أو ثلاث دقائق لحين أن يستعيد الشخص وعيه
أو تحضر سيارة الإسعاف.



8

الإنعاش

اقلب الشخص إلى "وضعية الإنعاش"
إذا كنت تعرف الطريقة.
ابق معه لحين وصول الإسعاف.



استخدم naloxone لإبطال مفعول جرعة أوبيويد زائدة (كالهيرويين أو المورفين أو الميثادون أو الأوكسيكودون أو عقاقير الأوبيويد التي يصفها الطبيب أو الفنتانيل). يأخذ naloxone مفعوله بعد دقيقتين إلى 5 دقائق ويستمر المفعول حوالي 30 إلى 90 دقيقة.

للمزيد من المعلومات والدعم بشأن معالجة المخدرات اتصل بـ "خدمة

المعلومات لشؤون الكحول والمخدرات" التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام

الأسبوع على الرقم 1800 250 015 مجاناً من أي مكان في أستراليا.