

阿片类药物过量反应

请按照以下步骤使用Nyxoid鼻腔喷雾剂

1

安全

检查接受打针的人和地方有没有任何不安全因素。



2

阿片类药物是否过量？ 留意下列征兆：

- 没有反应
- 瞳孔缩小
- 呼吸不正常——呼吸浅慢或打鼾
- 皮肤苍白或冰冷，嘴唇和指尖呈蓝色或灰色



3

打电话三个零（000）



4

让被抢救者仰卧


让被抢救者仰卧，
检查鼻腔没有堵塞



5

像这样拿着NYXOID


请记住：Nyxoid®只包含1次使用的剂量。



6

将纳洛酮 (NALOXONE) 注入鼻腔


将Nyxoid®的喷嘴插入鼻孔。
按压喷嘴，把药喷进鼻孔，直到喷嘴发出咔嗒声为止。



7

他们有没有呼吸？


如果没有，就要做人工呼吸，如果您懂得怎样做的话——吹进2口气。



8

复苏


如果您懂得怎样做的话，
让患者处于复苏体位。
在救护车到达之前，一直陪着他们。



9

必要时再次给药

如果没有反应，在另一个鼻孔中喷进第二剂Nyxoid®。
如果有的话，每隔2至3分钟再给一剂，直到病人恢复或救护车到达。



使用纳洛酮来矫正阿片类药物过量（例如海洛因、吗啡、美沙酮、羟考酮、阿片类药物处方药、芬太尼等）。这种药在2至5分钟后开始生效，持续大约30至90分钟。

如果需要有关毒品相关治疗（drug treatment）的信息和支持，在澳大利亚境内任何地方每周7天、每天24小时都可以打免费电话1800 250 015 给酒精与毒品信息服务热线。