

# 阿片类药物过量反应

注射Prenoxad纳洛酮 (naloxone) 请遵循以下步骤

1

## 安全

检查接受打针的人和地方有没有任何不安全因素。



2

## 阿片类药物是否过量？ 留意下列征兆：

- 没有反应
- 瞳孔缩小
- 呼吸不正常——呼吸浅慢或打鼾
- 皮肤苍白或冰冷，嘴唇和指尖呈蓝色或灰色



3

## 打电话三个零 (000)



4


## 让患者侧卧

让患者处于复苏体位  
(recovery position)



5


### 将针头拧在预装 PRENOXAD 的针筒上面



6

### 将针头放在注射部位


将针头插入大腿外侧  
或上臂。



7

### 打一剂纳洛酮 (NALOXONE)

注射0.4毫升，直到针筒上的  
第一条黑线（Prenoxad 针  
筒含有5次注射的剂量）。



8

### 他们有没有呼吸？

如果没有，就要做人工  
呼吸，如果您懂得怎样做  
的话——让被抢救的人仰  
卧，然后吹进2口气。



9

### 复苏


如果您懂得怎样做的话，  
让患者处于复苏体位。  
在救护车到达之前，  
一直陪着他们。



10

### 必要时再次给药

如果没有反应，每隔2至3  
分钟再注射一针0.4毫升的  
剂量（直至下一条黑线），  
直到患者康复或救护车  
到达。



使用纳洛酮来矫正阿片类药物过量（例如海洛因、吗啡、美沙酮、羟考酮、阿片类药物处方药、芬太尼等）。这种药在2至5分钟后开始生效，持续大约30至90分钟。

如果需要有关毒品相关治疗（drug treatment）的信息和支持，  
在澳大利亚境内任何地方每周7天、每天24小时都可以打免费电话  
1800 250 015 给酒精与毒品信息服务热线。