

阿片類藥物過量反應

注射Prenoxad納洛酮 (naloxone) 請遵循以下步驟

1

安全

检查接受打針的人和地方有沒有任何不安全因素。



2

阿片類藥物是否過量？ 留意下列徵兆：

- 沒有反應
- 瞳孔縮小
- 呼吸不正常——呼吸淺慢或打鼾
- 皮膚蒼白或冰冷，嘴唇和指尖呈藍色或灰色



3

打電話三個零 (000)

我认为是用藥過量



4


让患者側卧

让患者處於復甦體位 (recovery position)。



5


將針頭擰在預裝 PRENOXAD 的針筒上面



6

將針頭放在注射部位


將針頭插入大腿外側
或上臂。



7

打一劑納洛酮 (NALOXONE)

注射0.4毫升，直到針筒上的
第一條黑線（Prenoxad針
筒含有5次注射的劑量）。



8

他們有沒有呼吸？

如果沒有，就要做人工
呼吸，如果您懂得怎樣做
的話——讓被搶救的人仰
臥，然後吹進2口氣。



9

復甦


如果您懂得怎樣做的話，
讓患者處於復甦體位。
在救護車到達之前，
一直陪著他們。



10

必要時再次給藥

如果沒有反應，每隔2至3
分鐘再注射一針0.4毫升的
劑量（直至下一條黑線），
直到患者康復或救護車
到達。



使用納洛酮來矯正阿片類藥物過量（例如海洛因、嗎啡、美沙酮、羟考酮、阿片類藥物處方藥、芬太尼等）。這種藥在2至5分鐘後開始生效，持續大約30至90分鐘。

如果需要有關毒品相關治療（drug treatment）的資訊和支持，
在澳大利亞境內任何地方每週7天、每天24小時都可以打免費電話
1800 250 015 給酒精與毒品資訊服務熱線。