NSW 州保健省

B 型肝炎ワクチン

保護者向け資料

オーストラリア政府は、全国予防接種プログラム（NIP）の下で、一部のワクチンを無料で提供しています。

Q. B 型肝炎とは何ですか？

B 型肝炎は、発熱、黄疸、体調不良を引き起こす可能性のあるウイルスです。それは、肝臓の損傷（肝硬変）または肝臓がんを引き起こす場合があります。一部の人々は、自分が B 型肝炎に感染していることに気づかず、他の人に感染を広げる可能性があります。

Q. B 型肝炎ウイルスはどのように感染しますか？

B 型肝炎ウイルスは以下の方法で感染します。

- **出産（感染した母親から赤ちゃんへの母子感染）**
- **開いた傷口や潰瘍との接触**
- **危険な性交渉**
- **針刺し事故**
- **不衛生な器具を使ったタトゥーやピアスの施術**
- **針の共有**

Q. ワクチンはどのように作用しますか？

ワクチンは、免疫系が感染症と戦うのを助けます。予防接種を受けた人がこれらの感染症に接触した場合、免疫系がより効果的に対処できるため、その発症を予防したり、症状を軽減することができます。

Q. B 型肝炎のワクチンの効果はどの程度ですか？

B 型肝炎のワクチンは、ウイルスの感染予防に非常に効果的です。

Q. 何回の接種が必要ですか？

- **10 歳から 19 歳の子供や若者は、子供用のワクチンを 3 回接種する必要があります。**
- **もしくは、11 歳から 15 歳の子供や若者で、乳児期や幼少期にワクチンを接種していない場合は、大人用のワクチンを 2 回接種することができます。**

Q. 誰がこのワクチン接種を受けるべきですか？

B 型肝炎ワクチンの完全接種を済ませていないすべての子供や若者が、ワクチン接種を受けるべきです。

Q. このワクチン接種を受けるべきでないのは、どのような人ですか？

次に該当する人には、このワクチンを投与しないでください。

- **以前にこのワクチンを接種した時、またはワクチンの成分に対して、重度のアレルギー反応（アナフィラキシー）を起こしたことがある人**
- **妊娠している人**

Q. ワクチンはどれくらい安全ですか？

オーストラリアのワクチンは非常に安全です。薬品・医薬品行政局（TGA）から承認を得る前に、安全性に関する厳しい検査を通過する必要があります。使用開始後も、TGA がワクチンの安全性を監視しています。

Q. B 型肝炎のワクチンには何が含まれていますか？

このワクチンには以下の成分が含まれています。

- **ワクチンの作用を促進する水酸化アルミニウム**
- **酵母タンパク質（含まれている場合がある）**
- **牛由来の材料（含まれている場合がある）**

Q. このワクチンにはどのような副反応がありますか？

副反応は通常軽度で、次のような症状が現れる可能性があります。

- **接種部位に痛み、発赤、または腫れ**

重篤な副反応は非常にまれです。

詳細については、health.nsw.gov.au/schoolvaccination で消費者向け医薬品情報（CMI）をご確認ください。副反応について心配な場合は、かかりつけの医師にご相談ください。

Q. アナフィラキシーとは何ですか？

アナフィラキシーは非常に稀ですが、重度のアレルギー反応です。素早く対処しなければ、意識を失ったり、死に至る場合もあります。ワクチン接種を行う医療従事者は、アナフィラキシーに対処するための訓練を受けています。