NSW Health

Vaccin contre le papillomavirus humain (PVH)

Fiche d'information pour les parents

Le gouvernement australien offre gratuitement certains vaccins pour les adolescents dans le cadre du programme national de vaccination *(National Immunisation Program (NIP))*.

Q. Qu'est-ce que le PVH et comment se propage-t-il ?

Le PVH (papillomavirus humain) est un virus courant qui touche les hommes et les femmes. Il se transmet par contact génital lors de rapports sexuels avec une personne atteinte du virus. Le virus pénètre par de minuscules lésions dans la peau et ne se propage pas par le sang ou d'autres fluides corporels. Les préservatifs offrent une protection limitée car ils ne couvrent pas toute la peau des parties génitales.

Tous les types de PVH ne provoquent pas de symptômes. De nombreuses personnes atteintes du PVH ne le savent pas.

Certains types de PVH provoquent des verrues sur le corps, y compris sur les organes génitaux (vulve, vagin, col de l'utérus, pénis, scrotum, anus et périnée). Les verrues sont généralement indolores mais peuvent provoquer des démangeaisons ou une sensation d'inconfort. Ces types sont dits « à faible risque » parce qu'ils ne provoquent pas de cancer.

D'autres types de PVH, dits « à haut risque », peuvent entraîner la croissance de cellules anormales. Ces cellules peuvent se transformer en cancer si elles ne sont pas traitées.

Causes du PVH à haut risque :

- **presque tous les cancers du col de l'utérus**
- **90 % des cancers de l'anus**
- **78 % des cancers du vagin**
- **60 % des cancers de la gorge**
- **25 % des cancers de la vulve**
- **50 % des cancers du pénis.**

La vaccination des hommes permet de prévenir les cancers et les verrues chez les hommes et de protéger les femmes contre le cancer du col de l'utérus.

Q. Comment fonctionnent les vaccins ?

Les vaccins aident le système immunitaire à lutter contre les infections. Si une personne vaccinée est exposée à ces infections, son système immunitaire peut mieux les combattre, soit en empêchant la maladie de se développer, soit en la rendant moins grave.

Q. Quel vaccin sera utilisé ?

Le vaccin contre le PVH protège contre 9 types de PVH : 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58.

Q. Combien de doses du vaccin contre le papillomavirus sont nécessaires ?

La recherche montre qu'une dose de vaccin contre le PVH offre la même protection que deux doses. Sur cette base, l'Australie utilise désormais un protocole à une dose.

Certains adolescents dont le système immunitaire est affaibli ont besoin de trois doses. Ils doivent recevoir la deuxième dose deux mois après la première, et la troisième dose quatre mois après la deuxième.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont notamment celles qui souffrent de :

- **troubles du système immunitaire**
- **VIH**
- **cancer**
- **transplantations d'organes**
- **les maladies auto-immunes**
- **un traitement immunosuppresseur puissant (mais pas de problèmes de rate).**

Q. Que se passe-t-il si mon enfant a déjà reçu une dose ?

Si votre enfant a déjà reçu une dose, il n'a pas besoin d'une deuxième dose. Il est complètement vacciné.

Les femmes vaccinées auront toujours à se soumettre à un dépistage régulier du cancer du col de l'utérus (anciennement frottis). Le vaccin contre le PVH ne protège pas contre tous les types de papillomavirus. Il est recommandé aux femmes de plus de 25 ans

de passer un test de dépistage du cancer du col de l'utérus tous les cinq ans, même si elles sont vaccinées.

Q. Qui doit se faire vacciner contre le PVH ?

Tous les élèves de Year 7 ou les enfants de 12 ans et plus devraient recevoir une dose du vaccin contre le PVH.

Q. Qui ne devrait pas recevoir le vaccin contre le PVH ?

Le vaccin contre le PVH ne doit pas être administré aux personnes qui :

- **sont enceintes ou pensent l'être**
- **ont eu une réaction allergique grave (anaphylaxie) à un précédent vaccin anti-PVH ou à ses composants**
- **sont allergiques à la levure.**

Q. Quelle est l'efficacité du vaccin contre le papillomavirus ?

Le vaccin contre le PVH protège contre les types de PVH à haut risque qui sont à l'origine de plus de 90 % des cancers du col de l'utérus chez les femmes. Il protège également contre d'autres types de PVH qui provoquent des cancers chez l'homme.

Des études montrent que le vaccin offre une protection de près de 100 %, même plus de 10 ans après la vaccination. Depuis le début du programme de vaccination, il y a eu :

- **50 % d'anomalies cervicales de haut niveau en moins dans les groupes d'âge vaccinés**
- **90 % de cas de verrues génitales en moins chez les jeunes de moins de 21 ans.**

Le cancer du col de l'utérus se développe sur une période de plus de 10 ans, de sorte qu'il faudra du temps pour que l'effet du vaccin sur les taux de cancer du col de l'utérus se manifeste pleinement. Le taux de cancer du col de l'utérus a déjà baissé de manière significative grâce au Programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (lancé en 1991) et au Programme de vaccination contre le PVH (lancé en 2007).

Q. Que contient le vaccin contre le PVH ?

Le vaccin contre le PVH contient de la levure, un adjuvant à base d'aluminium, du chlorure de sodium, de la L-histidine, du polysorbate et du borate de sodium. Ces substances sont incluses en quantités infimes pour faciliter l'action du vaccin ou le préserver.

Q. Les vaccins sont-ils sûrs ?

Les vaccins utilisés en Australie sont sûrs. Ils doivent subir des tests de sécurité stricts avant d'être approuvés par la *Therapeutic Goods Administration (TGA)*. La TGA contrôle également la sécurité des vaccins après leur utilisation.

Q. Quels sont les effets secondaires du vaccin contre le papillomavirus ?

Les effets secondaires sont généralement légers, comme une douleur, un gonflement ou une rougeur à l'endroit où la piqûre a été faite. Ces effets disparaissent généralement en quelques jours. Les effets secondaires graves sont très rares.

Pour plus d'informations sur les effets secondaires, consultez le site *Consumer Medicines Information (CMI)* à l'adresse suivante : health.nsw.gov.au/schoolvaccination.

Si vous vous inquiétez des effets secondaires, contactez votre médecin généraliste. Ils peuvent également signaler les effets secondaires à l'unité locale de santé publique.

Q. Qu'est-ce que l'anaphylaxie ?

L'anaphylaxie est une réaction allergique grave qui peut entraîner une perte de conscience ou la mort si elle n'est pas traitée rapidement. Elle est très rare après la vaccination. Les personnes qui administrent le vaccin sont formées pour traiter l'anaphylaxie si un cas se présente.

Q. Que se passe-t-il si j'attends que mon enfant soit plus âgé ?

La vaccination contre le PVH est plus efficace lorsqu'elle est administrée avant que l'enfant ne devienne sexuellement actif. Les vaccins ne peuvent être administrés à l'école que si vous renvoyez le formulaire de consentement signé pendant que votre enfant est encore à l'école. Si vous attendez, vous devrez prendre rendez-vous avec un médecin généraliste ou un pharmacien pour vous faire vacciner.

Q. Ma fille aura-t-elle encore besoin d'un dépistage du cancer du col de l'utérus ?

Oui. Les femmes vaccinées auront toujours à se soumettre à un dépistage régulier du cancer du col de l'utérus (anciennement frottis). Le vaccin contre le PVH ne protège pas contre tous les types de PVH susceptibles de provoquer un cancer du col de l'utérus.

Il est recommandé aux femmes âgées de 25 ans et plus, qui ont été sexuellement actives, de subir un test de dépistage du cancer du col de l'utérus tous les cinq ans, même si elles sont vaccinées.