

# التلقيح ضد هباتايتس ب لمولودك الجديد



## مزيد من المعلومات

دائرة صحة نيو ساوث ويلز  
[health.nsw.gov.au/immunisation](http://health.nsw.gov.au/immunisation)

دائرة الصحة في الحكومة الأسترالية  
[health.gov.au/health-topics/immunisation](http://health.gov.au/health-topics/immunisation)

### MumBubVax

[mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine](http://mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine)

ورقة معلومات صادرة من نيو ساوث  
ويلز عن هباتايتس ب

[health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/  
Pages/Hepatitis\\_B.aspx](http://health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx)

## السجل الأسترالي للتحصين

[servicesaustralia.gov.au/individuals/  
services/medicare/australian-  
immunisation-register](http://servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register)

## احفظ التاريخ للتلقيح

من المهم أن تتأكد من إجراء التلقيحات في مواعيدها لكي تتأمن حماية الأطفال من سن مبكرة وألا يكونوا في خطر الإصابة بأمراض خطيرة.



تأكد من جدول  
التحصين في نيو  
ساوث ويلز لمعرفة  
موعد التلقيح  
القادم لطفلك في  
[health.nsw.gov.  
au/vaccinate](http://health.nsw.gov.au/vaccinate)

## سجلي الصحي الشخصي (الدفتـر الأزرق)



من المهم إحضار الدفتـر الأزرق الخاص بطفلك معك في كل موعد لتسجيل تلقيحات طفلك فيه من جانب الطبيب العام/الممرض.

## هباتايتس ب

يمكن أن يؤدي فيروس هباتايتس ب إلى مرض طويل الأجل في الكبد، مثل تشمّع الكبد والسرطان. وهناك احتمال بنسبة 90% أن تنشأ عدوى مزمنة لمدى حياة الأطفال الذين يُصابون وهم صغارٌ بهباتايتس ب.

إن هباتايتس ب شديد العدوى ويمكن أن ينتشر بسهولة عبر:

- انتقاله من الأم المصابة به إلى طفلها عند ولادته
- وخز الجلد بأشياء غير نظيفة مثل الإبر وسفريات الحلاقة
- الاتصال المباشر بين دم شخص مصابٍ به وجرح مفتوح، مثل الكشوط والجروح
- ممارسة الجنس مع شخص مصاب به.

## الاختبار خلال الحمل

يجب اختبار احتمال وجود هباتايتس ب لدى جميع النساء خلال فحص الحمل العام. إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية سيحتاج الطفل لعلاج لتجنبيه العدوى واحتمال إصابته بمرض مزمن في الكبد. وقد يوصى بعلاج للأم أيضاً.

## الوقاية

ما زال لقاح هباتايتس ب يُستخدَم في أستراليا منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، علماً بأن التلقيح أفضل وسيلة للوقاية من المرض.

## لقاح هباتايتس ب للمواليد الجدد

يُعرض تلقيح جميع المواليد الجدد ضد هباتايتس ب عند ولادتهم وذلك لـ:

- منع انتشار المرض من الأم، إذا كانت مصابة به، إلى طفلها. وقد لا تكون الأم أحياناً مدركة أنها مصابة بالمرض؛ و
- منع انتشار المرض في الأشهر الأولى من حياة الطفل من أشخاص مصابين به يعيشون في نفس المنزل مع الطفل أو من أشخاص آخرين قد يكونون مصابين بالمرض.

## جدول التلقيح ضد هباتايتس ب

يوصى بإعطاء طفلك جرعة من لقاح هباتايتس ب عند ولادته أو خلال أول 7 أيام من حياته، تتبعها ثلاث جرعات أخرى من لقاح هباتايتس ب في سن 6 أسابيع و4 أشهر و6 أشهر.

## سلامة لقاح هباتايتس ب

تبيّن الخبرة الطويلة في استخدام لقاح هباتايتس ب أنه مأمون ويتحمّله المواليد الجدد. والآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للقاح خفيفة، وهي تشمل احمرار وورم موضع الحقنة. هذا ولا يتعارض لقاح هباتايتس ب مع الإرضاع من الثدي.

## علاج المواليد الجدد المولودين لأمهات مصابات بهباتايتس ب

بالإضافة إلى عرض جرعة من لقاح هباتايتس ب عند الولادة، فإنه يُعرض للطفل الذي يولد لأم تكون مصابة بهباتايتس ب دواءً يسمّى "غلوبولين مناعي خاص بهباتايتس ب" خلال 12 ساعة من ولادته لتأمين وقاية إضافية له. من الضروري أيضاً إكمال البرنامج الكامل من لقاح هباتايتس ب لتأمين الحماية على المدى الطويل.

## اختبارات إضافية للأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بهباتايتس ب

يحتاج الطفل الذي يولد لأم تكون مصابة بهباتايتس ب لاختبار دم بعد 3 أشهر من إكمال برنامج التلقيح ضد هباتايتس ب للتأكد من وقايته. وستتلقين أنت وطبيبك رسالة تذكيرية من دائرة صحة نيو ساوث ويلز.

