


التلقيح ضد هباتايتس ب

لمولودك
الجديد

سجلي الصحي الشخصي
(الدفترا الأزرق)

من المهم إحضار الدفترا الأزرق
الخاص بطفلك معك في كل
موعد لتسجيل تلقيحات طفلك
فيه من جانب الطبيب/الممرض.



مزيد من المعلومات

دائرة صحة نيو ساوث ويلز

www.health.nsw.gov.au/immunisation

الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة الصحة
في الحكومة الأسترالية

www.health.gov.au

المركز الوطني لبحوث التحصين
ومراقبته (NCIRS)

www.ncirs.edu.au/about/index.php

ورقة معلومات صادرة من NCIRS عن
هباتايتس ب

[www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/
hepatitis-B-fact-sheet.pdf](http://www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/hepatitis-B-fact-sheet.pdf)

الموقع الإلكتروني الخاص بالسجل
الأسترالي لتحصين الأطفال

[www.humanservices.gov.au/customer/services/
medicare/australian-childhood-immunisation-register](http://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register)

جدول التحصين في نيو ساوث ويلز

تفقد الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة صحة نيو ساوث
ويلز للاطلاع على جدول التحصين في نيو ساوث ويلز
على العنوان: [www.health.nsw.gov.au/immunisation/
Pages/schedule.aspx](http://www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/schedule.aspx)

احفظ التاريخ للتلقيح

من المهم أن تتأكد من إجراء التلقيحات في مواعيدها
لكي تتأمن حماية الأطفال من سن مبكرة وألا يكونوا في
خطر الإصابة بأمراض خطيرة. قد يساعدك التطبيق الذي
يمكن تنزيله على الهاتف "احفظ التاريخ للتلقيح" في
التأكد من إجراء تلقيحات طفلك في مواعيدها.



تفقد الموقع الإلكتروني الخاص بـ "احفظ التاريخ
للتلقيح" ("Save the Date to Vaccinate") للاطلاع على
معلومات وموارد مفيدة مثل القدرة على طبع جدول
تحصين شخصي لطفلك (أو أطفالك) ومقاطع فيديو، على
العنوان www.immunisation.health.nsw.gov.au/

علاج المواليد الجدد المولودين لأمهات مصابات بهباتايتس ب

بالإضافة إلى عرض جرعة من لقاح هباتايتس ب عند الولادة، فإنه يُعرض للطفل الذي يولد لأم تكون مصابة بهباتايتس ب دواءً يسمّى ”غلوبولين مناعي خاص بهباتايتس ب“ خلال 12 ساعة من ولادته لتأمين وقاية إضافية له. من الضروري أيضاً إكمال البرنامج الكامل من لقاح هباتايتس ب لتأمين الحماية على المدى الطويل.

اختبارات إضافية للأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بهباتايتس ب

يحتاج الطفل الذي يولد لأم تكون مصابة بهباتايتس ب لاختبار دم بعد 3 أشهر من إكمال برنامج التلقيح ضد هباتايتس ب للتأكد من وقايته. وقد يتم إرسال رسالة تذكيرية إليك وإلى طبيبك من دائرة صحة نيو ساوث ويلز.

لقاح هباتايتس ب للمواليد الجدد

يُعرض تلقيح جميع المواليد الجدد ضد هباتايتس ب عند ولادتهم وذلك لـ :

- منع انتشار المرض من الأم، إذا كانت مصابة به، إلى طفلها. وقد لا تكون الأم أحياناً مدركة أنها مصابة بالمرض؛ و
- منع انتشار المرض في الأشهر الأولى من حياة الطفل من أشخاص مصابين به يعيشون في نفس المنزل مع الطفل أو من أشخاص آخرين قد يكونون مصابين بالمرض.

جدول التلقيح ضد هباتايتس ب

يوصى بإعطاء طفلك جرعة من لقاح هباتايتس ب عند ولادته أو خلال أول 7 أيام من حياته، تتبعها ثلاث جرعات أخرى من لقاح هباتايتس ب في سن 6 أسابيع و4 أشهر و6 أشهر.

سلامة لقاح هباتايتس ب

تبيّن الخبرة الطويلة في استخدام لقاح هباتايتس ب أنه مأمون ويتحمّله المواليد الجدد. والآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للقاح خفيفة، وهي تشمل احمرار وورم موضع الحقنة. هذا ولا يتعارض لقاح هباتايتس ب مع الإرضاع من الثدي.

هباتايتس ب

يمكن أن يؤدي فيروس هباتايتس ب إلى مرض طويل الأجل في الكبد، مثل تشمّع الكبد والسرطان. وهناك احتمال بنسبة 90% أن تنشأ عدوى مزمنة لمدى حياة الأطفال الذين يُصابون وهم صغاراً بهباتايتس ب.

إن هباتايتس ب شديد العدوى ويمكن أن ينتشر بسهولة عبر:

- انتقاله من الأم المصابة به إلى طفلها عند ولادته
- وخز الجلد بأشياء غير نظيفة مثل الإبر وشفرات الحلاقة
- الاتصال المباشر بين دم شخص مصابٍ به وجرح مفتوح، مثل الكشوط والجروح
- ممارسة الجنس مع شخص مصاب به.

الاختبار خلال الحمل

يجب اختبار احتمال وجود هباتايتس ب لدى جميع النساء خلال فحص الحمل العام. إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية سيحتاج الطفل لعلاج لتجنّيبه العدوى واحتمال إصابته بمرض مزمن في الكبد. وقد يوصى بعلاج للأم أيضاً.

الوقاية

ما زال لقاح هباتايتس ب يُستخدَم في أستراليا منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، علماً بأن التلقيح أفضل وسيلة للوقاية من المرض.

