

واکسین هیپاتیتیس ب

برای طفل
نو تولد شما



ثبت سلامتی شخصی ام
(کتاب آبی)

این مهم است که کتاب آبی فرزند خود را در هر وقت ملاقات برای ثبت واکسیانسیون با خود بیاورید تا توسط داکتر/نرس ثبت گردد.



برای معلومات بیشتر

مراجعه به وب سایت اداره صحت نیو سوت ویلز

www.health.nsw.gov.au/immunisation

حکومت آسترالیا

وبسایت دیپارتمنت صحت

www.health.gov.au

مرکز ملی برای جلوگیری از امراض

اداره ریسرچ و مراقبت (NCIRS)

www.ncirs.edu.au/about/index.php

ورقهء تشریح حقایق در باره هیپاتیتیس ب

www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/hepatitis-B-fact-sheet.pdf

وب سایت ثبت معافیت اطفال در
آسترالیا

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register

SHPN (CHP) 130462

December 2013 © NSW Ministry of Health.

برنامه ایمن سازی NSW

برای برنامه ایمن سازی NSW به وب سایت صحت

NSW به: www.health.nsw.gov.au/immunisation/

Pages/schedule.aspx

Save the Date to Vaccinate

”ثبت تاریخ تطبیق واکسین“

این مهم است تا مطمئن باشید که واکسین ها در زمان آن تطبیق شده است طوری که نوزادان از خطر ابتلا به بیماری های جدی محفوظ باشند. 'Save the Date to Vaccinate' ”ثبت تاریخ تطبیق واکسین“ تیلیفون ممکن است کمک کند تا اطمینان حاصل شود که واکسین های طفل شما در زمان آن تطبیق شده است.



برای معلومات مفید و منابع از جمله توانایی چاپ يك برنامه ایمن سازی شخصی برای فرزند (فرزندان) وب سایت 'Save the Date to Vaccinate' و فیدو ها، به وب سایت www.immunisation.health.nsw.gov.au/ چک نمائید.

تداوی کودکانیکه از مادر مبتلاء به هیپاتیتیس ب تولد میشوند

همان طوریکه یک مقدار از واکسین هیپاتیتیس ب در وقت تولد به طفل داده میشود، طفلی که از مادر مبتلاء به هیپاتیتیس تولد میشود به او دوائی به نام هیپاتیتیس امیونوگلو بولین hepatitis B immunoglobulin در ظرف 12 ساعت از وقت تولد برای حفاظت بیشتر داده میشود. برای حفاظت طویل المدت دادن مقدار مکمل واکسین هیپاتیتیس ب اساسی میباشد.

معاینات بیشتر اطفالیکه از مادر مبتلاء به هیپاتیتیس ب تولد میشوند

طفلی که از مادر مبتلاء به هیپاتیتیس ب تولد میشود به یک معاینه خون بعد از سه ماه از اكمال تطبیق واکسین هیپاتیتیس ب ضرورت دارد تا به مصئونیت او در مقابل مرض اطمینان حاصل گردد. یک نامه یاد آوری برای شما و داکتر شما از طرف اداره صحت نیو سوت ویلز ارسال میگردد.

واکسین هیپاتیتیس ب برای کودکان نو تولد

به همه کودکان نو تولد هنگام ولادت واکسین هیپاتیتیس داده میشود تا :

- تا انتشار مرض را از مادریکه به این میکروب مبتلا باشد جلوگیری کند. بعضی اوقات مادر ممکن است نداند که این مرض را دارد و،
- از انتشار مرض در اوایل ماهائی تولد از اشخاص مصاب که در عین منزل محل رهايش زندگی میکنند و یا اشخاص دیگریکه ممکن است آلوده باشند جلوگیری کند.

پرو گرام تطبیق واکسین هیپاتیتیس ب

سفارش شده است که برای طفل شما واکسین هیپاتیتیس ب در زمان تولد داده شود ویا در ظرف 7 روز اول زندگی او، که با تطبیق سه مقدار دیگر واکسین در مدت 6 هفته، و در سنین 4 و 6 ماهگی داده میشود.

مصئونیت واکسین هیپاتیتیس ب

تجارب جدی نشان داده است که تطبیق واکسین هیپاتیتیس بی خطر است و توسط اطفال نو تولد بخوبی قابل تحمل میباشد. تاثیرات جانبی که بسیار عمومیت دارد جزئی میباشد که عبارت از سرخی و پندیدگی در ناحیه تطبیق واکسین است. این واکسین با تغذیه طفل از پستان مادر تاثیری ندارد.

هیپاتیتیس ب (Hepatitis B)

ویروس هیپاتیتیس ب میتواند سبب مرضی مداوم جگر مانند رسیدن آسیب به نسج جگر و ابتلاء به سرطان جگر گردد. کودکانیکه به میکروب هیپاتیتیس ب آلوده گردند 90 در صد چانس ابتلاء به مرضی مزمن آلودگی در طول حیات را دارند.

هیپاتیتیس ب بسیار ساری میباشد و به آسانی از طرق ذیل انتشار میکند:

- مادریکه آلوده به میکروب باشد آنرا هنگام تولد به فرزندش انتقال میدهد
- درزیکه در جلد به اثر استعمال اشیاء کثیف مانند پاکتی و سوزن ایجاد گردد میتواند سبب انتقال میکروب گردد
- تماس مستقیم بین خون آلوده شخص و زخم سرباز دیگری مانند خراشیدگی و بریدگی در جلد
- رابطه جنسی با شخص آلوده به میکروب.

معاینه در زمان حامله گی

همه خانمها باید از نگاه هیپاتیتیس ب در زمان معمول حامله گی معاینه گردند. اگر نتیجه معاینه مثبت باشد طفل ضرورت به تداوی خواهد داشت تا از آلودگی جلوگیری شده و مبتلاء به مرضی مزمن جگر نگردد. ممکن است تداوی برای مادر نیز سفارش گردد.

جلو گیری

واکسین هیپاتیتیس ب از اوایل سال 1980 در استرالیا مورد استعمال قرار گرفت و تطبیق واکسین بهترین طریق جلو گیری از مرضی میباشد.

