

هیپاتیتیس ب واکسین برای طفل نوزاد شما



برای معلومات بیشتر

صحت نیوساوت ویلز

health.nsw.gov.au/immunisation

وزارت صحت حکومت آسترالیا

health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax

mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

نیوساوت ویلز ورقهء معلوماتی در بارهء هیپاتیتیس ب

health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx

ثبت واکسیناسیون آسترالیا

servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register

تاریخ تطبیق واکسین را یادداشت کنید

این مهم است تا مطمئن باشید که واکسین ها در زمان آن تطبیق شده است طوریکه نوزادان از خطر ابتلا به بیماری های جدی محفوظ باشند.

**تاریخ تطبیق واکسین را
یادداشت کنید**

واکسیناسیون به موقع بهترین محافظت از طفل شما در برابر امراض جدی است

زمان واکسیناسیون فرزند خود را بررسی کنید

جدول زمانی واکسیناسیون NSW را بررسی کنید تا بدانید وقت واکسیناسیون بعدی نوزاد شما در چه وقتی در health.nsw.gov.au/vaccinate است.

ثبت سلامتی شخصی ام (کتاب آبی)



این مهم است که کتاب آبی فرزند خود را در هر وقت ملاقات برای ثبت واکسیناسیون با خود بیاورید تا توسط داکتر / نرس ثبت گردد.

تداوی کودکانیکه از مادر مبتلاء به هیپاتیتیس ب تولد میشوند

همان طوریکه یک مقدار از واکسین هیپاتیتیس ب در وقت تولد به طفل داده میشود، طفلی که از مادر مبتلاء به هیپاتیتیس ب تولد میشود به او دوائی به نام هیپاتیتیس ب امیونوگلوبولین hepatitis B immunoglobulin در ظرف 12 ساعت از وقت تولد برای حفاظت بیشتر داده میشود. برای حفاظت طویل المدت دادن مقدار مکمل واکسین هیپاتیتیس ب اساسی میباشد.

معاینات بیشتر اطفالیکه از مادر مبتلاء به هیپاتیتیس ب تولد میشوند

طفلی که از مادر مبتلاء به هیپاتیتیس ب تولد میشود به یک معاینه خون بعد از سه ماه از اكمال تطبیق واکسین هیپاتیتیس ب ضرورت دارد تا به مصئونیت او در مقابل مرض اطمینان حاصل گردد. به شما و داکتر شما نامه یادآوری از NSW Health ارسال خواهد شد.



واکسین هیپاتیتیس ب برای کودکان نوزاد

به همه کودکان نوزاد هنگام ولادت واکسین هیپاتیتیس ب داده میشود تا:

- تا انتشار مرض را از مادریکه به این میکروب مبتلا باشد جلو گیری کند. بعضی اوقات مادر ممکن است نداند که این مرض را دارد و،
- از انتشار مرض در اوایل ماهائی تولد از اشخاص مصاب که در عین منزل محل رهایش زندگی میکنند و یا اشخاص دیگریکه ممکن است آلوده باشند جلوگیری کند.

پرو گرام تطبیق واکسین هیپاتیتیس ب

برای طفل شما واکسین هیپاتیتیس ب در زمان تولد یا در ظرف 7 روز اول زندگی او توصیه می شود، که با تطبیق سه دوز دیگری از واکسین هیپاتیتیس ب در 6 هفتهگی، و 4 ماهگی و 6 ماهگی تعقیب میشود.

مصئونیت واکسین هیپاتیتیس ب

تجارب جدی نشان داده است که تطبیق واکسین هیپاتیتیس بی خطر است و توسط اطفال نوزاد بخوبی قابل تحمل میباشد. تأثیرات جانبی که بسیار عمومیت دارد جزئی میباشد که عبارت از سرخی و پندیدگی در ناحیه تطبیق واکسین است. این واکسین با تغذیه طفل از پستان مادر تأثیری ندارد.

هیپاتیتیس ب (Hepatitis B)

ویروس هیپاتیتیس ب میتواند سبب مرضی مداوم جگر مانند رسیدن آسیب به نسج جگر و ابتلاء به سرطان جگر گردد. کودکانیکه به میکروب هیپاتیتیس ب آلوده گردند 90 در صد چانس ابتلاء به مرضی مزمن آلودگی در طول حیات را دارند.

هیپاتیتیس ب بسیار ساری میباشد و به آسانی از طرق ذیل انتشار میکند:

- مادریکه آلوده به میکروب باشد آنرا هنگام تولد به فرزندش انتقال میدهد
- درزیکه در جلد به اثر استعمال اشیاء کثیف مانند پاکي و سوزن ایجاد گردد میتواند سبب انتقال میکروب گردد
- تماس مستقیم بین خون آلوده شخص و زخم سرباز دیگری مانند خراشیدگی و بریدگی در جلد
- رابطه جنسی با شخص آلوده به میکروب.

معاینه در زمان حاملگی

همه خانمها باید از نگاه هیپاتیتیس ب در زمان معمول حامله گی معاینه گردند. اگر نتیجه معاینه مثبت باشد طفل ضرورت به تداوی خواهد داشت تا از آلودگی جلوگیری شده و مبتلاء به مرضی مزمن جگر نگردد. ممکن است تداوی برای مادر نیز سفارش گردد.

جلوگیری

واکسین هیپاتیتیس ب از اوایل سال 1980 در استرالیا مورد استعمال قرار گرفت و تطبیق واکسین بهترین طریق جلوگیری از مرضی میباشد.