

Calendário de Imunização de NSW

Visite o sítio web da NSW Health para ver o actual Calendário de Imunização de NSW:


www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/schedule.aspx

Reserve a Data para Vacinar

É importante garantir que as vacinas são administradas **atempadamente** para que os bebés estejam protegidos cedo e não corram o risco de contrair doenças graves. O aplicativo 'Reserve a Data para Vacinar' (Save the Date to Vaccinate) para telefones pode ajudar a garantir que as vacinas da sua criança são administradas a tempo.



Consulte o sítio web 'Save the Date to Vaccinate' para obter mais informações e recursos úteis, tais como imprimir um calendário personalizado de imunização para a(s) sua(s) criança(s) e vídeos, na página www.immunisation.health.nsw.gov.au/



O meu Registo Pessoal de Saúde (Livro Azul)

É importante levar o Livro Azul da sua criança a cada consulta para que as vacinas da sua criança sejam registadas pelo/a médico/a ou enfermeiro/a.

MAIS INFORMAÇÕES

Sítio web da NSW Health

www.health.nsw.gov.au/immunisation

Sítio web do Departamento de Saúde do Governo Australiano

www.health.gov.au

O Centro Nacional para Pesquisa e Vigilância da Imunização (NCIRS)

www.ncirs.edu.au/about/index.php

A folha informativa sobre a Hepatite B do NCIRS

www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/hepatitis-B-fact-sheet.pdf

Sítio web do Registo Australiano de Imunização Infantil

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register

Vacina contra a hepatite B

Para o seu Bébê Recém-Nascido



Hepatite B

O vírus da hepatite B pode causar doenças crónicas do fígado tais como a cirrose e o cancro do fígado. Bebés infectados com a hepatite B têm uma chance de 90% de contrair uma infecção crónica permanente.

A hepatite B é muito infecciosa e pode ser facilmente transmitida por:

- uma mãe infectada, transmitindo-a ao seu bebé durante o parto
- uma picada com um objecto sujo, tal como uma agulha ou lâmina
- contacto directo entre o sangue de uma pessoa infectada e uma ferida aberta, por exemplo, esfoladelas e cortes
- sexo com uma pessoa infectada.

Rastreio Pré-Natal

Todas as mulheres devem fazer o rastreio da hepatite B durante os testes de rastreio pré-natal. Se o teste for positivo, o bebé necessitará tratamento para prevenir a infecção e o risco de doença crónica do fígado. O tratamento pode também ser recomendado para a mãe.

Prevenção

A vacina contra a hepatite B é usada na Austrália desde o início dos anos 80 e a vacinação é o melhor meio de prevenir a doença.

A Vacina contra a Hepatite B para Recém-Nascidos

A vacina contra a hepatite B é oferecida a todos os bebés recém-nascidos imediatamente após o parto para:

- Prevenir a transmissão da doença de uma mãe infectada ao seu bebé. Por vezes a mãe pode não saber que está infectada; e
- Prevenir a transmissão da doença nos primeiros meses de vida por pessoas infectadas que vivam na mesma casa ou outras pessoas que possam estar infectadas.

O Programa de Vacinação contra a Hepatite B

Recomenda-se ser administrada uma dose da vacina contra a hepatite B ao seu bebé imediatamente após o parto ou durante os primeiros 7 dias de vida, seguida de três outras doses da vacina contra a hepatite B às 6 semanas, aos 4 meses e aos 6 meses de idade.

A Segurança da Vacina contra a Hepatite B

Vasta experiência mostra que a vacina contra a hepatite B é segura e bem tolerada por bebés recém-nascidos. Os efeitos secundários mais comuns da vacina são ligeiros e incluem vermelhidão e inchaço no local da injeção. A vacina contra a hepatite B não interfere com o aleitamento materno.

Tratamento de Bebés Nascidos de Mães Infectadas com a Hepatite B

Além de uma dose da vacina contra a hepatite B ser oferecida imediatamente após o parto, um tratamento chamado 'imunoglobulina anti-hepatite B' será também oferecido a um bebé nascido de uma mãe infectada com a hepatite B dentro de 12 horas após o parto, de modo a fornecer protecção adicional. É essencial que o programa completo da vacina contra a hepatite B seja também completado para protecção a longo prazo.

Testes Suplementares para Bebés Nascidos de Mães Infectadas com a Hepatite B

Um bebé nascido de uma mãe infectada com a hepatite B necessita fazer uma análise de sangue 3 meses após ter completado o programa de vacinação contra a hepatite B para verificar se está protegido. A NSW Health poderá enviar-lhe, e ao/à seu/sua médico/a, uma carta para a lembrar.

