

График иммунизации в штате НЮУ


Посетите сайт NSW Health для ознакомления с текущим графиком иммунизации в штате НЮУ: www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/schedule.aspx

Зарезервируйте дату для вакцинации

Важно, чтобы вы следили за **своевременной** вакцинацией. Таким образом детям будет обеспечиваться своевременная защита и устраняться риск серьезных заболеваний. Телефонное приложение 'Save the Date to Vaccinate' (Зарезервируйте дату для вакцинации) может помочь вам обеспечить своевременную вакцинацию вашего ребенка.



Посетите сайт 'Save the Date to Vaccinate' (Зарезервируйте дату для вакцинации) для получения полезной информации и ресурсов, таких как возможность распечатать личный график иммунизации вашего (ваших) ребенка (детей) и посмотреть видеофильмы: www.immunisation.health.nsw.gov.au/



Моя личная медицинская карта (синяя книга)

Важно приносить «синюю книгу» вашего ребенка на каждый прием с тем, чтобы врач/медсестра отмечали в ней каждую прививку вашего ребенка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайт NSW Health

www.health.nsw.gov.au/immunisation

Сайт Департамента здравоохранения австралийского правительства

www.health.gov.au

Национальный центр исследований и наблюдения в области иммунизации (NCIRS)

www.ncirs.edu.au/about/index.php

Информационный листок NCIRS о гепатите В


www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/hepatitis-B-fact-sheet.pdf

Сайт Австралийского реестра иммунизации детей

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register

Прививка от гепатита В

для вашего новорожденного



Гепатит В

Гепатит В может вызвать долгосрочное заболевание печени, такое как цирроз печени и рак. Вероятность возникновения пожизненной хронической инфекции у младенцев, которые заразились гепатитом В, составляет 90%.

Гепатит В является высокозаразным заболеванием и может легко передаваться следующим образом:

- инфицированная мать передает его своему ребенку при родах
- повреждение кожи нечистыми предметами, такими как иглы и лезвия
- прямой контакт между кровью инфицированного человека и открытой раной, например, царапинами и порезами
- секс с инфицированным человеком.

Обследование во время беременности

Все женщины должны обследоваться на гепатит В во время обычного скрининга беременности. Если результаты обследования положительные, то ребенку необходимо будет лечение для недопущения инфекции и риска хронического заболевания печени. Лечение может быть также рекомендовано матери.

Профилактика

В Австралии вакцина от гепатита В используется с начала 1980-х годов, при этом вакцинация является наилучшим способом предотвращения заболевания.

Вакцина от гепатита В для новорожденных

Всем новорожденным предлагается вакцина от гепатита В при рождении для:

- недопущения распространения заболевания от инфицированной матери ребенку. Бывает так, что мать не знает, что у нее есть это заболевание; и
- недопущения распространения заболевания в первые месяцы жизни от инфицированных людей, живущих в одном и том же доме, и других людей, которые возможно, инфицированы.

График вакцинации от гепатита В

Рекомендуется, чтобы вашему ребенку дали дозу вакцины от гепатита В при рождении или в первые 7 дней жизни, а затем еще три дозы вакцины от гепатита В по исполнению ему 6 недель, 4 и 6 месяцев.

Безопасность вакцины от гепатита В

Богатый накопленный опыт показывает, что вакцина от гепатита В является безопасной; она хорошо переносится новорожденными. Самые распространенные побочные последствия вакцины незначительны. К ним относятся покраснение и припухлость в месте инъекции. Вакцина от гепатита В не препятствует кормлению грудью.

Лечение детей, рожденных матерями, инфицированными гепатитом В

Помимо предложения дать дозу вакцины от гепатита В ребенку при рождении, ребенку, рожденному матерью, инфицированной гепатитом В, будет также предложен медицинский препарат, именуемый «иммуноглобулином против гепатита В» в 12-часовой срок после рождения для обеспечения дополнительной защиты. Важно, чтобы был пройден полный курс вакцинации от гепатита В для долгосрочной защиты.

Дополнительное обследование детей, рожденных матерями, инфицированными гепатитом В

Ребенку, рожденному матерью, инфицированной гепатитом В, следует сделать анализ крови 3 месяца спустя после прохождения курса вакцинации от гепатита В для проверки того, есть ли у него защита. Вам и вашему врачу, возможно, направят письмо-напоминание от NSW Health.

