

## ตารางการฉีดวัคซีนรัฐนิวเซาท์เวลส์


ไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อดูตารางการฉีดวัคซีนรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่: [www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/schedule.aspx](http://www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/schedule.aspx)

## นัดวันไปรับวัคซีน (Save the Date to Vaccinate)

การรับวัคซีนตรงตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทารกแต่เนิ่นๆและทำให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรง แอปสำหรับโทรศัพท์มือถือชื่อ 'Save the Date to Vaccinate' จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าบุตรของท่านได้รับการฉีดวัคซีนตรงตามกำหนดเวลา



ค้นหาข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์เช่นพิมพ์ตารางการรับวัคซีนส่วนตัวสำหรับบุตร และวิดีโอได้ที่เว็บไซต์ของ 'Save the Date to Vaccinate' ที่ [www.immunisation.health.nsw.gov.au/](http://www.immunisation.health.nsw.gov.au/)



## สมุดบันทึกการรับ วัคซีนส่วนบุคคล (Blue Book- บลูบุ๊ก)

การนำสมุดบันทึกการรับวัคซีนของบุตรหรือบลูบุ๊กไปในวันนัดหมายฉีดวัคซีนเพื่อให้พยาบาลหรือแพทย์ลงบันทึกไว้มีความสำคัญมาก

## ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์  
[www.health.nsw.gov.au/immunisation](http://www.health.nsw.gov.au/immunisation)

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขประเทศออสเตรเลีย  
[www.health.gov.au](http://www.health.gov.au)

เว็บไซต์สถาบันวิจัยภูมิคุ้มกันโรคและการเฝ้าระวังโรคแห่งชาติ (หรือ NCIRS)  
[www.ncirs.edu.au/about/index.php](http://www.ncirs.edu.au/about/index.php)

ข้อมูลโรคตับอักเสบชนิดบีของ NCIRS  
[www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/hepatitis-B-fact-sheet.pdf](http://www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/hepatitis-B-fact-sheet.pdf)

เว็บไซต์ทะเบียนการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรคในวัยเด็กของออสเตรเลีย  
[www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register](http://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register)

# การฉีดวัคซีน ป้องกันโรค ตับอักเสบชนิดบี

สำหรับ  
ทารก  
วัยแรกเกิด



## โรคตับอักเสบชนิดบี

ไวรัสตับอักเสบชนิดบีเป็นสาเหตุให้เกิดโรคตับในระยะยาวได้เช่นตับแข็งและมะเร็งตับ ทารกที่ติดเชื้อตับอักเสบชนิดบีมีโอกาสร้อยละ 90 ที่จะเป็นโรคตับแบบเรื้อรังไปตลอดชีวิต

โรคตับอักเสบชนิดบีเป็นโรคติดต่อร้ายแรงและสามารถแพร่สู่ผู้อื่นได้ง่ายดายโดย

- แพร่จากแม่ที่เป็นโรคไปยังลูกระหว่างคลอด
- ผิวหนังถูกที่มตำด้วยอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดเช่น เข็มฉีดยาและมีดโกน
- เลือดของผู้ติดเชื้อสัมผัสโดยตรงกับบาดแผลเปิด เช่น รอยถลอกและบาดแผล
- การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ

## การตรวจโรคขณะตั้งครรภ์

ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจโรคตับอักเสบชนิดบีเมื่อมารับการตรวจโรคตามปกติระหว่างการตั้งครรภ์ หากผลการตรวจพบมีการติดเชื้อ ทารกจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการเสี่ยงต่อโรคตับแบบเรื้อรัง แม่อาจได้รับคำแนะนำให้ได้รับการรักษาด้วย

## การป้องกัน

ได้มีการนำวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบีมาใช้ในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ต้นคริสต์ทศวรรษที่ 80 และการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค

## วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี สำหรับทารกวัยแรกเกิด

ทารกแรกเกิดทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบีเมื่อแรกเกิดเพื่อ

- ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากแม่ที่เป็นโรคไปยังลูก ในบางครั้งแม่อาจไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนี และ
- ป้องกันการแพร่เชื้อโรคในระยะแรกหลังคลอดจากผู้ที่เป็นโรคซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันหรือจากผู้อื่นซึ่งเป็นโรค

## ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี

ลูกของท่านควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบีหนึ่งเข็มเมื่อแรกเกิดหรือภายใน 7 วันแรกหลังคลอด และรับเพิ่มอีกสามเข็มเมื่ออายุครบ 6 สัปดาห์, 4 เดือน และ 6 เดือน

## ความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานแสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบีมีความปลอดภัย และทารกแรกเกิดทนต่อวัคซีนได้ดี อาการข้างเคียงที่พบบ่อยมักเป็นอาการเพียงเล็กน้อยเช่น บวมและแดงที่บริเวณฉีดยา วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบีไม่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนม

## การรักษาทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของโรคตับอักเสบชนิดบี

ทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของโรคตับอักเสบชนิดบี นอกจากจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบีหนึ่งเข็มหลังคลอดแล้ว ยังได้รับ “อิมมูโนโกลบูลินต้านโรคตับอักเสบบี” ภายใน 12 ชั่วโมงหลังคลอดอีกด้วย เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ทารกยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบีให้ครบชุดอีกด้วยเพื่อให้ภูมิคุ้มกันในระยะยาว

## การตรวจเพิ่มเติมสำหรับทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของโรคตับอักเสบชนิดบี

ทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของโรคตับอักเสบชนิดบี ต้องได้รับการตรวจเลือด 3 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอัก

เสบชนิดบีครบชุดแล้ว เพื่อตรวจดูว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ ท่านและแพทย์ของท่านอาจได้รับจดหมายเตือนจากกระทรวงสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์

