


គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ រដ្ឋញូវសៅវ៉ែល

បើកមើលរ៉ឺបសែច័របស់ក្រសួងសុខាភិបាល រដ្ឋញូវសៅវ៉ែល ដើម្បីពិនិត្យ គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ រដ្ឋញូវសៅវ៉ែល បច្ចុប្បន្ននៅត្រង់៖ www.health.nsw.gov.au/schedule

Save the Date to Vaccinate (កត់ទុកកាលបរិច្ឆេទដើម្បីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ)

ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគទាន់ពេលវេលា គឺជាការការពារដ៏ល្អបំផុតរបស់កូន អ្នក ដើម្បីប្រឆាំងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទាំងឡាយ។ កម្មវិធី 'Save The Date To Vaccinate' អាចជួយអ្នកឱ្យប្រាកដថា ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរបស់កូនអ្នក ត្រូវបានផ្តល់ជូនទាន់ពេលវេលា។



ចូលទៅកាន់រ៉ឺបសែច័ 'Save The Date To Vaccinate' ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី និងបង្កើតគម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដែលបានណែនាំ របស់គ្រួសារអ្នក៖ www.health.nsw.gov.au/immunisation



កំណត់ត្រាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន របស់ខ្ញុំ (សៀវភៅពណ៌ខៀវ)

ជាការសំខាន់ដែលត្រូវយកសៀវភៅពណ៌ខៀវ របស់កូនអ្នក ទៅកាន់ការណាត់ជួបនីមួយៗ ដើម្បីឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិត / គិលានុបដ្ឋាកកត់ត្រា ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ របស់កូនអ្នក។

ទម្រង់បែបបទ កំណត់ត្រាការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

ទម្រង់បែបបទ កំណត់ត្រាការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសម្រាប់មនុស្ស ពេញវ័យ អាចទទួលយកបាននៅតាមរ៉ឺបសែច័ www.health.nsw.gov.au/recordvaccines ដែលអាចជួយ អ្នកក្នុងការតាមដានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានបន្ថែម

ក្រសួងសុខាភិបាល រដ្ឋញូវសៅវ៉ែល www.health.nsw.gov.au/immunisation

បញ្ជីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអូស្ត្រាលី

<https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register>

ក្រសួងសុខាភិបាល រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី

<https://beta.health.gov.au/health-topics/immunisation>

កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្នុងមុនពេលសម្រាលកូន រដ្ឋញូវសៅវ៉ែល

www.health.nsw.gov.au/protectnewborns

ការមានផ្ទៃពោះ

ការការពារ និងការចាក់ថ្នាំបង្ការ រោគចាប់ពីមុនពេលមានផ្ទៃពោះ ទៅពេលសម្រាលកូន



មុនពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះ

មុនពេលមានផ្ទៃពោះ គឺជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរបស់អ្នក ឱ្យបានទាន់បច្ចុប្បន្នភាព ដោយហេតុថាវាអាចសុំនឹងជំងឺរបស់អ្នកនឹងត្រូវ បន្តទៅឱ្យទារករបស់អ្នក ហើយការនេះនឹងផ្តល់នូវការការពារក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍នៃ ជីវិតរបស់ទារក មុននឹងអាចទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។ ជំងឺមួយចំនួនអាច ធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់ការមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នក ដូច្នេះគឺជាការប្រសើរបំផុតដែលអ្នក ត្រូវការការមុនពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះ។ ការធ្វើតេស្តជំងឺសាមញ្ញមួយអាចបង្ហាញថា តើអ្នកបានទទួលការការពារឬអត់។

រោគកញ្ជ្រើល ស្រឡាទែន និងស្នូច (MMR)

ប្រសិនបើអ្នកឆ្លងរោគកញ្ជ្រើល ស្រឡាទែន និងស្នូចក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ អ្នកអាចរលូតកូន កើតកូនមិនគ្រប់ខែ ឬទារករបស់អ្នកអាចកើតមានភាព មិនគ្រប់លក្ខណៈពិការភ័យខ្លាចធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើអ្នកពុំបានការពារទេ អ្នកគួរតែ ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។ ជាការសំខាន់ដែលអ្នកមិនត្រូវមានផ្ទៃពោះក្នុងរយៈពេល ២៨ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។

រោគអុតស្វាយ (អុតស្វាយ)

រោគអុតស្វាយ អាចបណ្តាលឱ្យមានភាព ពុំគ្រប់លក្ខណៈពិការភ័យខ្លាចធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិនបើអ្នកឆ្លងរោគនេះក្នុងអំឡុងពេល មានផ្ទៃពោះ។ អ្នកគួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានការពារទេ។ បន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ អ្នកត្រូវ ជៀសវាងកុំឱ្យមានផ្ទៃពោះក្នុងរយៈ ពេល២៨ថ្ងៃ។



ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងមានផ្ទៃពោះ

រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់រូប ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកមើលការឆ្លងរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដោយហេតុថាវាអាចចម្លងបន្តទៅទារករបស់ពួកគេ ក្នុងអំឡុងពេលសម្រាលកូន។ ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺ អ្នកប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសពិនិត្យអ្នក ហើយទារករបស់អ្នកនឹងចាំបាច់ទទួលបានការចាក់ថ្នាំពីម្តាយ ក្នុងរយៈពេល១២ម៉ោង ក្រោយពីបានកើតមក។ ដោយគ្មានការព្យាបាលនេះទេ ទារករបស់អ្នកអាចកើតរោគ រលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ដែលអាចនាំឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងឡាយ ដូចជាការខូចថ្លើម ឬជំងឺមហារីកថ្លើម។

រោគក្អកក្អម

ថ្នាំចាក់បង្ការរោគក្អកក្អម ជាទូទៅត្រូវបានផ្តល់ឱ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅ២៨សប្តាហ៍ (អាចផ្តល់ឱ្យបានគ្រប់ពេលចន្លោះពី២០-៣២សប្តាហ៍) នៃការមានផ្ទៃពោះម្តងៗ ហើយគួរតែបានផ្តល់ឱ្យជាឆាប់បំផុត (ចាប់ពី២០សប្តាហ៍) ដល់ស្ត្រីដែលត្រូវបាន កំណត់ថាមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការកើតកូនមុនពេលកំណត់។ ការនេះនឹងផ្តល់ការ ការពារសម្រាប់អ្នក និងទារករបស់អ្នក ដោយហេតុថាអង្គបដិបត្តិនិងបន្តឱ្យទារក របស់អ្នកនៅក្នុងស្បូន។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្អកក្អមក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ មានសុវត្ថិភាពទាំងម្តាយ និងទារកដែលមិនទាន់កើត។

អ្នកគួរស្នើសុំឱ្យដៃគូរបស់អ្នក ជំនួយពីការរស់នៅទារក និងអ្នកមើលថែពេញ ពេញវ័យជិតស្និទ្ធដទៃទៀត ឱ្យចាក់ថ្នាំបង្ការរោគយ៉ាងហោចណាស់ពីសប្តាហ៍ មុនពេលទារករបស់អ្នកកើតមក ប្រសិនបើពួកគេមិនបានថ្នាំបង្ការរោគក្អកក្អម ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

គ្រុនផ្តាសាយធំ

គ្រុនផ្តាសាយធំក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ អាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ជាមួយនឹងការកើន ឡើងនៃហានិភ័យការកើតកូនមិនគ្រប់ខែ និងផលវិបាកផ្សេងៗទៀត។ ការចាក់ ថ្នាំបង្ការគ្រុនផ្តាសាយធំក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ មានសុវត្ថិភាព និងមាន ប្រសិទ្ធភាព ហើយត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់។ ថ្នាំបង្ការគ្រុនផ្តាសាយធំ ផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ហើយក៏ផ្តល់ការការពារដល់ទារករបស់អ្នកក្នុងស្បូន និងក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មាន ខែដំបូងនៃជីវិតផងដែរ។

បន្ទាប់ពីសម្រាលកូន

វាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគជាប្រចាំឱ្យបាន ភ្លាមៗ ក្រោយពេលទារកកើតមក ទោះបីជាអ្នកកំពុងបំបៅកូនដោយទឹកដោះ ម្តាយក៏ដោយ។ អ្នកគួរតែចាត់ថ្នាំបង្ការរោគក្អកក្អម មុនពេលអ្នកចេញពី មន្ទីរពេទ្យ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្នុងអំឡុងពេលអ្នកមាន ផ្ទៃពោះ។

ការចាក់ថ្នាំលើកទីមួយរបស់ទារកអ្នក គឺរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ត្រូវបានណែនាំ បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនរួចរាល់ ហើយការចាក់ថ្នាំតាមគម្រោងបន្ទាប់នឹងដល់កំណត់ នៅពេលទារករបស់អ្នកមានអាយុ៦អាទិត្យ។

ទារកកើតពីម្តាយដែលមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ចាំបាច់ត្រូវការធ្វើតេស្តឈាម ៣ខែបន្ទាប់ពីបានបំបៅញូត្រូចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដើម្បីឱ្យប្រាកដ ថាពួកគេបានទទួលការការពារ។ អ្នក និងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹងបានទទួលលិខិត លើកមួយច្បាប់ពីគ្រូស្នងសុខាភិបាល រដ្ឋញូស៊ែស៊ែល។

ជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគរបស់អ្នក ឱ្យបានទាន់ បច្ចុប្បន្នភាព ដោយហេតុថា ភាពសុំនឹងជំងឺរបស់អ្នក នឹងត្រូវ បន្តទៅឱ្យទារករបស់អ្នក។