

ตารางการฉีดวัคซีนรัฐนิวเซาท์เวลส์

ไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อดูตารางการฉีดวัคซีนรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่:
www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule

นัดวันไปรับวัคซีน (Save the Date to Vaccinate)

การรับวัคซีนตรงตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทารกแต่เนิ่นๆและทำให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรง แอปสำหรับโทรศัพท์มือถือ 'Save the Date to Vaccinate' จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าบุตรของท่านได้รับการฉีดวัคซีนตรงตามกำหนดเวลา



ค้นหาข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์เช่นพิมพ์ตารางการรับวัคซีนส่วนตัวสำหรับบุตร และวิดีโอได้ที่เว็บไซต์ของ 'Save the Date to Vaccinate' ที่ www.immunisation.health.nsw.gov.au



สมุดบันทึกการรับวัคซีนส่วนบุคคล (Blue Book- บลูบุ๊ก)

การนำสมุดบันทึกการรับวัคซีนของบุตรหรือบลูบุ๊ก ไปในวันนัดหมายฉีดวัคซีนเพื่อให้พยาบาลหรือแพทย์ลงบันทึกไว้มีความสำคัญมาก

แบบฟอร์มบันทึกการรับวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
ค้นหาแบบฟอร์ม บันทึกการรับวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ได้ที่ www.health.nsw.gov.au/immunisation ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการรับวัคซีนของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์

www.health.nsw.gov.au/immunisation

เว็บไซต์ทะเบียนการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรคในวัยเด็กของออสเตรเลีย (Australian Childhood Immunisation Register)

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register

โปรแกรมการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรคของออสเตรเลีย (Immunise Australia Program) กระทรวงสาธารณสุขประเทศออสเตรเลีย

www.immunise.health.gov.au

โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนในระยะตั้งครรภ์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Antenatal Pertussis Vaccination Program)

www.health.nsw.gov.au/protectnewborns

การตั้งครรภ์

ภูมิคุ้มกันและการฉีดวัคซีนตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด



ก่อนที่ท่านจะตั้งครรภ์

การฉีดวัคซีนให้ครบก่อนตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากภูมิคุ้มกันของท่านสามารถส่งผ่านไปให้ทารกได้และจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ทารกในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคลอดก่อนที่จะได้รับการฉีดวัคซีน การติดเชือบางชนิดมีอันตรายต่อการตั้งครรภ์ดังนั้นการป้องกันก่อนการตั้งครรภ์จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด วิธีการตรวจเลือดอย่างง่ายสามารถบอกได้ว่าท่านมีภูมิคุ้มกันหรือไม่

โรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน

หากท่านเป็นโรคหัด คางทูม หรือหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์ ท่านอาจแท้ง คลอดก่อนกำหนด หรือทารกอาจมีความพิการร้ายแรงแต่กำเนิดได้ หากท่านไม่มีภูมิคุ้มกันท่านควรได้รับวัคซีน สิ่งที่สำคัญคือท่านต้องไม่ตั้งครรภ์ภายหลังการฉีดวัคซีนเป็นเวลา **28 วัน**

โรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใสสามารถทำให้ทารกมีความพิการรุนแรงแต่กำเนิดได้หากท่านเป็นโรคนี้ระหว่างตั้งครรภ์ ท่านควรได้รับวัคซีนหากยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ท่านต้องหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ภายหลังการฉีดวัคซีนเป็นเวลา **28 วัน**



ในระหว่างที่ท่านตั้งครรภ์

โรคไวรัสตับอักเสบบี

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เพราะเชื้อนี้สามารถผ่านไปยังทารกในระหว่างคลอด หากท่านเป็นโรคนี้ท่านควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทารกจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีหลังคลอดโดยการให้ “อิมมิวโนโกลบูลิน” และฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี หากทารกไม่ได้รับการรักษานี้อาจทำให้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในระยะต่อมา ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาเช่นตับถูกทำลายหรือมะเร็งตับ

โรคไอกรน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนคือในช่วงสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ทุกครั้ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะอายุครรภ์ 28 สัปดาห์) เพื่อให้ภูมิคุ้มกันแต่เนิ่นๆแก่ท่านและทารก เพราะสารภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีจะถูกส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนในขณะที่ตั้งครรภ์มีความปลอดภัยต่อแม่และทารกในครรภ์

ท่านควรขอให้คู่ครอง ญาติผู้ใหญ่ของทารก และผู้ใหญ่ใกล้ชิดท่านใดที่เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลเด็ก ไปฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนทารกคลอด หากพวกเขายังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไขหวัดใหญ่

การป่วยเป็นไขหวัดใหญ่ในระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นอันตรายร้ายแรงทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการคลอดก่อนกำหนด และทารกมีน้ำหนักตัวน้อย การฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ในระหว่างตั้งครรภ์ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และแนะนำให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนรับวัคซีนนี้ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์รับวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ได้ฟรีซึ่งจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ทารกในครรภ์ได้ด้วยไปจนถึงหกเดือนหลังคลอด

ระยะหลังคลอดบุตร

ท่านสามารถรับวัคซีนที่กำหนดให้ฉีดตามปกติได้อย่างปลอดภัยทันทีหลังคลอด รวมทั้งในขณะที่ให้นมบุตร ท่านควรรับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนก่อนกลับบ้าน หากยังไม่ได้ฉีดในช่วงสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์

วัคซีนเข็มแรกที่บุตรของท่านได้รับคือวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งแนะนำให้ฉีดทันทีหลังคลอด และวัคซีนเข็มถัดไปฉีดเมื่อบุตรของท่านอายุ 6-8 สัปดาห์

ทารกที่เกิดจากมารดาที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จะต้องได้รับการตรวจเลือด 3 เดือนหลังจากฉีดวัคซีนครบตามกำหนดแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทารกมีภูมิคุ้มกัน ท่านและแพทย์ของท่านอาจได้รับจดหมายเตือนจากกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาว่าเวลส์

การฉีดวัคซีนให้ครบเป็น
สิ่งสำคัญเนื่องจาก
ภูมิคุ้มกันของท่านจะส่ง
ผ่านไปให้ทารกได้