

इन्फ्लुएन्जाको संक्रमणबाट हुने जोखिमहरूको तुलना गर्नुहोस्

सामान्य लक्षणहरू

- ज्वरो, गला दुख्ने, सिगान बगिरहने, सुकखा खोकी, टाउको दुख्ने र मांशपेशीहरू दुख्ने (१ हप्ता अथवा त्यो भन्दा बढी)
- बच्चाहरूमा गला तथा स्वाशनलीमा समस्या देखिने

सामान्य जटिलताहरू

- निमोनिया
- कान र पिनास सम्बन्धी संक्रमणहरू
- मुटुको मांशपेशीहरू सुन्निने र मुटुको वरिपरि रहेको पातलो झिल्ली सुन्निने
- जौर्ण चिकित्सकीय अवस्था खराब हुँदै जाने (जस्तै कन्जेस्टीव हार्ट फेलर, सि ओ पि डी)

दुर्लभ जटिलताहरू

- रगत विषालु हुने
- मष्तिष्कमा असर
- मृत्यु

फ्लु खोपबाट हुने सामान्य प्रतिकूल घटनाहरू

सामान्य प्रतिकूल नतिजाहरू

- पीडा/दुखाइ, रातो हुने र/सुई लगाएको ठाउँ वरिपरि सुन्निने
- छोटो समयको लागि ज्वरो आउने, थकाई लाग्ने र अथवा मांशपेशी दुख्ने (१ – २ दिन)

दुर्लभ प्रतिकूल नतिजाहरू

- अर्तिकरिआ (छाला रातो हुने, चिलाउने)

अति दुर्लभ प्रतिकूल नतिजाहरू

- अनाफाइलेक्सिस (एलर्जिक प्रतिक्रियाबाट हुने संवेदनशीलता)
- झन्झन् हुने
- गिलन बार सिण्ड्रोम (१ मिलियन डोसेसमा १ भन्दा कम)

खोप कहाँ गएर लगाउने

पहिले आफ्नो कार्यस्थलमा सम्पर्क गर्नुहोस् किनभने धेरैजसो स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई इन्फ्लुएन्जाको खोप उपलब्ध गराउँछन्।

वैकल्पिक रूपमा, मौसमी इन्फ्लुएन्जा तपाईंको जी.पी. (डाक्टर) मार्फत र केही सामुदायिक औषधि पसलहरूमा उपलब्ध हन्छ।

थप जानकारीको लागि

तपाईंको स्थानिय सार्वजनिक स्वास्थ्य एकाई (Public Health Unit): 1300 066 055

एन.एस.डब्ल्यु स्वास्थ्य इन्फ्लुएन्जा पृष्ठ (NSW Health influenza page): www.health.nsw.gov.au/flu

इम्युनाइज अष्ट्रेलिया प्रोग्राम (Immunise Australia Program): www.immunise.health.gov.au

नेशनल सेन्टर फर इम्युनाइजेसन रिसर्च एण्ड सर्भेयलेन्स (National Centre for Immunisation Research and Surveillance): www.ncirs.edu.au



Health



Health

कर्मचारी इन्फ्लुएन्जा (कडा रुघाखोकी) खोप



तपाईं आफैलाई र तपाईंका रेजिडेन्टहरूलाई बचाउनुहोस्।

तपाईं आफैलाइ र तपाईंका रेजिडेन्ट-हरूलाई बचाउनुहोस् ।

आवासिय स्याहार सुविधा केन्द्रहरूमा बस्नेहरूलाई फलु (रुघाखोकी) को कारणले उल्लेखनीय जोखिम पुग्नसक्छ। त्यहाँ बस्नेहरूलाई स्याहार गर्ने मानिसहरूले प्रत्येक वर्ष फलुको खोप लिन आवश्यक छ।

खोपले निम्न कुराहरू कम गर्न सक्छ:

- कर्मचारीहरूले रेजिडेन्ट-हरूलाई भाइरस सार्नमा
- रेजिडेन्ट-हरूमा मृत्यु र रोगहरूको संख्यामा
- स्वास्थ्य सेवाहरूको मागमा
- घरपरिवार र साथीहरूमा फलु सार्नमा

फलु सम्बन्धी तथ्यहरू

के तपाईंलाई थाहा थियो:

- प्रत्येक वर्ष तीनजना स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूमध्ये एक जनालाई फलु लाग्नेछ
- चारजनामध्ये तीनजना स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू बिरामी हुँदा हुँदै पनि काममा उपस्थित हुन्छन्
- रेजिडेन्ट-हरूको लागि संक्रमणको श्रोत प्रायजसो स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू नै हुन्छन्
- लक्षण देखिनुभन्दा एक दिन पहिले र सात दिन पछिसम्म फलु सर्न सक्छ
- तपाईंमा फलु को लक्षण नदेखिए तापनि तपाईंले अरुलाई यो सार्न सक्नुहुन्छ

कसले खोप लिनु पर्छ

रेजिडेन्ट-हरूको स्याहार गर्न प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने सबै स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूले खोप लिनु पर्छ।

- बिरामीको सम्पर्कमा आउने प्रशासनिक कर्मचारीहरूले
- डाक्टरहरूले
- परिचारिका (नर्स) र स्याहारकर्ताले
- थेरापिस्ट (उपचार गर्ने) हरूले
- धार्मिक कार्यकर्ताहरूले
- सरसफाई गर्ने र भान्सामा काम गर्नेहरूले
- स्वयंसेवकहरूले
- अस्थायी तथा आशिक समय काम गर्ने कर्मचारीहरूले

कहिले खोप लिनुपर्छ

खोप उपलब्ध हुनासाथै यसको सुइ लई हाल्नुहोस् । फलु मौसमको बारेमा केही भन्न सकिदैन र यो अप्रिलको प्रारम्भदेखि नै शुरु हुनसक्छ र अक्टोबरको अन्तिमसम्म रहन सक्छ। फलु मौसम शुरु हुनुभन्दा पहिले यसको सुइ लिएमा निकै प्रभावकारी हुन्छ र यसले असर देखिन करीब २ हप्ता लाग्छ तर जतिबेला पनि यो सुइ लगाउन सकिन्छ।



तन्दुरुस्त र स्वस्थ मानिसलाई पनि फलु लाग्न सक्छ।

प्रत्येक वर्ष फलु खोप दिन आवश्यक पर्छ

वार्षिक रूपमा खोप लगाउनाले तपाईं र अरुहरूलाई फलुबाट बच्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको स्तर बढाउँछ। नयाँ किसिमको भाइरसहरूको असरहरूबाट बच्न प्रत्येक वर्ष अर्थावधिक खोप लगाउन आवश्यक छ किनभने फलु भाइरस बर्षे पिच्छे बदलिरहन सक्छ।

इन्फ्लुएन्जा सर्नबाट कम गर्नलाई:

- नियमित रूपमा साबुन र पानीले अथवा हात सफा गर्ने अल्कोहलले हात धुनुहोस्
- खोकदा अथवा हाछ्यु गर्दा टिस्युले आफ्नो मुख र नाक छोप्नुहोस्
- तपाईंले प्रयोग गर्नु भएको टिस्यु उत्तिनैखेर बिनमा फ्याक्नुहोस्

