

**The connection between TB and HIV**

**ទំនាក់ទំនងរវាងរោគ TB និងរោគ HIV**

នេះគឺជាសន្លឹកព័ត៌មានអំពីរោគរបេង (TB) និងមេរោគកង្វះភាពស៊ីនីងជម្ងឺក្នុងខ្លួនប្រាណមនុស្ស (HIV) ជាមេរោគបណ្តាលឱ្យកើតសហនិមិត្តហេតុនៃការមានរោគកង្វះភាពស៊ីនីងជម្ងឺ (អេដស៍) (AIDS) ។ មនុស្សដែលមានរោគ HIV ទំនងជាឈឺដោយសារការឆ្លងរោគ និងជម្ងឺដទៃទៀត។ TB គឺជាជម្ងឺមួយ ក្នុងចំណោមជម្ងឺទាំងនេះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានរោគ TB ឬប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ HIV សន្លឹកព័ត៌មាននេះគឺសំរាប់លោកអ្នក។

ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគេប៉ាន់ប្រមាណចំនួន៤០លាននាក់ ដែលរស់នៅមានរោគ HIV ឬ AIDS ប្រមាណជា១៣លាននាក់ក៏មានរោគ TB ដែរ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ HIV ក៏ដូចជារោគ TB ដែរនោះ ការរកឃើញរោគទាន់ពេលគឺជាការសំខាន់ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការព្យាបាលទាំងរោគ HIV និងទាំងរោគ TB។ ប្រសិនបើពុំបានព្យាបាលរោគឆ្លងទាំងពីរទេនេះ វាអាចធ្វើការជាមួយគ្នា ហើយបណ្តាលឱ្យកើតទៅជាជម្ងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

**ផ្នែកទី១: រោគរបេង (TB)**

**តើរោគ TB ជាអ្វី?**

រោគ TB បណ្តាលមកពីបាក់តេរី (មេរោគ)។ ជាទូទៅ វាជាជម្ងឺដែលប៉ះពាល់ដល់សួត ក៏ប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់គ្រឿងដទៃទៀតក្នុងខ្លួនប្រាណផងដែរដូចជាខួរក្បាល តម្រងនោម ឬឆ្អឹងខ្នង។ រោគ TB អាចមានសកម្មភាពនៅក្នុងខ្លួនប្រាណ ឬមិនទាន់ចេញមុខ (ដេកលក់)។ ប្រសិនបើពុំបានព្យាបាលទេ រោគ TB សកម្ម អាចបណ្តាលឱ្យកើតមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ឬដល់ស្លាប់។

**តើរោគ TB ឆ្លងរាលដាលយ៉ាងដូចម្តេច?**

បាក់តេរីនៃរោគ TB (មេរោគ) ឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ ទៅមនុស្សម្នាក់តាមខ្យល់អាកាស ហើយតាមធម្មតាឆ្លងរាលដាលនៅពេលដែលមនុស្សមាន TB សកម្ម ក្អក សើច កណ្តាស់ ឬច្រៀង។ នរណាម្នាក់ដែលនៅជិត អាចដកដង្ហើមស្រូបយកបាក់តេរី TB ទាំងនេះ ហើយឆ្លងរោគ TB។ រោគ TB មិនអាចឆ្លងរាលដាលដោយសារការប្រើប្រាស់ប្រដាប់ប្រដាក្នុងផ្ទះរួមគ្នាឡើយ ដូចជា កែវ ឬចាន ឬដោយសារទឹកមាត់នៅពេលចើបជញ្ជក់មាត់នរណាម្នាក់។

**តើអ្វីទៅជារោគសញ្ញានៃរោគ TB សកម្ម?**

អ្នកដែលមានរោគ TB សកម្ម ជាញឹកញាប់:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ទទួលអារម្មណ៍ខ្សោយ ឬឈឺ</li> <li>• ស្រកទម្ងន់យ៉ាងលឿន</li> <li>• ក្អក (ជួនកាលមានឈាម) និងឈឺដើមទ្រូង</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• គ្រុនក្តៅ ហើយ</li> <li>• បែកញើសនៅពេលយប់</li> <li>• ឬជួនកាលពុំមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ</li> </ul>
---	---

**តើរោគ TB សកម្ម និងរោគ TB មិនទាន់ចេញ មុខមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះ?**

មនុស្សដែលមានរោគ TB សកម្ម ឈឺបណ្តាលមកពីចំនួនមេរោគ TB ដ៏ច្រើនមានសកម្មភាពនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេ។ មនុស្សដែលមានរោគ TB មិនទាន់ចេញមុខ ក៏មានបាក់តេរីដែលបណ្តាលឱ្យកើតរោគ TB សកម្ម ផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានឈឺទេដោយសារបាក់តេរីមិនទាន់ចេញមុខ (ដេកលក់) នៅក្នុងខ្លួនរបស់គេ។ តាមធម្មតា គេធ្លាប់បានរងការប៉ះពាល់ដោយបាក់តេរី TB ពីអតីតកាលមកហើយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី មនុស្សដែលមានរោគ TB មិនទាន់ចេញមុខ ក៏អាចបង្កើតជារោគ TB សកម្ម នៅក្នុងពេលអនាគត ដែរជាពិសេសប្រសិនបើគេមានរោគ HIV។

<p>ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ <b>TB សកម្ម</b> មានន័យថាលោកអ្នក:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• មានបាក់តេរី TB សកម្មនៅក្នុងខ្លួនលោកអ្នក</li> <li>• ឈឺ ហើយលោកអ្នកអាចមានរោគសញ្ញាទាំងឡាយដូចជា ក្អក ក្អួន ស្រកទម្ងន់ ការឆ្អែកហត់ និងការបែកញើសនៅពេលយប់</li> <li>• ប្រហែលជាអាចចម្លងបាក់តេរីរោគ TB ទៅមនុស្សដទៃទៀត</li> <li>• អាចប្រើថ្នាំព្យាបាលដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺឱ្យជា</li> </ul>	<p>ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ <b>TB មិនទាន់ចេញមុខ</b> មានន័យថាលោកអ្នក:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• មានបាក់តេរីរោគ TB ក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់សកម្ម</li> <li>• ពុំទាន់ឈឺទេ</li> <li>• ពុំអាចចម្លងបាក់តេរី TB ទៅមនុស្សដទៃទៀតបានទេ</li> <li>• អាចប្រើថ្នាំព្យាបាលដើម្បីការពារកុំឱ្យកើតរោគ TB សកម្មក្នុងពេលអនាគត។</li> </ul>
--	--

## ផ្នែកទី២: មេរោគកង្វះភាពស៊ុនីងជម្ងឺក្នុងខ្លួនប្រាណមនុស្ស (HIV)

### តើរោគ HIV ជាអ្វី?

រោគ HIV គឺជាមេរោគដែលអាចបណ្តាលឱ្យកើតជម្ងឺ AIDS។ រោគ HIV វាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធការពាររោគក្នុងរាងកាយមនុស្ស។ ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវបានឆ្លងដោយរោគ HIV លោកអ្នកត្រូវបានគេហៅថាមានរោគ HIV វិជ្ជមាន។ នេះមានន័យថារោគ HIV បានចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់លោកអ្នកហើយ។

### តើរោគ HIV ឆ្លងយ៉ាងដូចម្តេច?

រោគ HIV ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងវត្តមានផងខ្លួនដូចជាឈាម ទឹកកាម ទឹករំអិលយោនី និងនៅក្នុងទឹកដោះមនុស្ស។ ការឆ្លងរោគ HIV អាចកើតមានឡើងប៉ុណ្ណោះ នៅពេលដែលវត្តមានក្នុងខ្លួនមួយ ឬច្រើនមុខនៅក្នុងចំណោមវត្តមានទាំងនេះ មកអំពីមនុស្សដែលកើតរោគនេះ ឆ្លងចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់មនុស្សដទៃទៀត។

រោគ HIV អាចឆ្លងដោយរបៀបដូចតទៅនេះតែប៉ុណ្ណោះ:

- ការរួមភេទដោយពុំប្រើស្រោមអនាម័យ (ការរួមភេទដែលគ្មានអ្វីការពារ)
- ការប្រើម្ជុលចាក់ ស៊ីរ៉ាំង និងគ្រឿងឧបករណ៍ចាក់គ្រឿងញៀនដទៃទៀតរួមគ្នា
- ចម្លងពីម្តាយ ទៅកូនក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ពេលសម្រាលកូន ឬការបំបៅកូននឹងទឹកដោះ
- ការចាក់បញ្ចូលឈាម និង/ឬផលិតផលផ្តល់ឈាម (នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ផលិតផលឈាមត្រូវបានគេពិនិត្យរកមើលរោគ HIV តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៥មកម៉្លោះ)

រោគ HIV មិនអាចឆ្លងដោយសារ: ការក្អក ចើប កណ្តាល់ ខាក ស្មោះ ស្រែក យំ ការប្រើកាំបិត កម្រាលពូក ស្រោមខ្នើយ បង្កន់ បន្ទប់ទឹក ឬការប៉ះពាល់ម្តងម្កាលតាមបែបផែនណាមួយឡើយ។

### តើអ្វីទៅជារោគសញ្ញានៃរោគ HIV?

លោកអ្នកមិនអាចដឹងថាអ្នកណាម្នាក់មានរោគ HIV ដោយគ្រាន់តែក្រឡេកមើលនោះឡើយ។ មនុស្សភាគច្រើនដែលមានរោគ HIV មើលទៅហាក់បីដូចជាមានសុខភាពល្អ ហើយពុំមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ។ វាប្រហែលជាត្រូវការពេលប្រហែលពីរ ឬបីឆ្នាំ មុននឹងរោគសញ្ញាណាមួយចាប់ផ្តើមបង្ហាញឱ្យឃើញ ហើយមនុស្សជាច្រើនដែលមានរោគ HIV ពុំទាំងដឹងថាខ្លួនគេមានរោគនេះឡើយ។

### តើរោគ HIV និងជម្ងឺ AIDS មានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះ?

រោគ HIV វាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធការពាររោគរបស់រាងកាយ។ ប្រសិនបើរោគនេះពុំបានទទួលការព្យាបាលទេ រោគ HIV ធ្វើឱ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធការពាររោគ ដើម្បីកុំឱ្យប្រព័ន្ធនេះអាចប្រយុទ្ធនឹងការឆ្លងរោគដែលគេតែងជួបប្រទះ ហើយមនុស្សអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការឆ្លងជម្ងឺ និងអាចបរាជ័យដល់ស្លាប់។ នេះគឺជាជម្ងឺមួយដែលគេស្គាល់ថាជាជម្ងឺ AIDS - សហនិមិត្តហេតុនៃការមានរោគកង្វះភាពស៊ុនីងជម្ងឺ។

<p>ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ HIV មានន័យថាលោកអ្នក:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• មានវាយរ៉ឺសដែលអាចបណ្តាលឱ្យកើតជម្ងឺ AIDS</li> <li>• ប្រហែលជាអាចពុំមានរោគសញ្ញាណាមួយឡើយ</li> <li>• អាចព្យាបាលបាន។</li> </ul>
---

### ផ្នែកទី៣: រោគ TB និងរោគ HIV - ការធ្វើតេស្ត និងការថតឆ្លុះពិនិត្យរកមើលជម្ងឺ

រោគ HIV ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធការពាររោគចុះអន់ខ្សោយ – “ វាបើកទ្វារឱ្យមេរោគឆ្លងដទៃទៀតចូល ” – ដូច្នោះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ HIV និងរោគ TB មិនទាន់ចេញមុខ លោកអ្នកទំនងជាតែរោគ TB សកម្មជាមិនខាន។ ប្រសិនបើពុំបានព្យាបាលរោគទាំងពីរនេះទេ វាអាចធ្វើការជាមួយគ្នា ហើយបណ្តាលឱ្យកើតទៅជាជម្ងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

#### ហេតុអ្វីបានជាការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើតេស្តរកមើលរោគ TB ប្រសិនបើខ្ញុំមានរោគ HIV?

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ HIV នេះគឺជាការសំខាន់ដែលត្រូវរកឱ្យបានដឹងថាតើលោកអ្នកមានរោគ TB មិនទាន់ចេញមុខដែរឬទេ ដោយព្រោះថារោគ TB មិនទាន់ចេញមុខ ទំនងជាក្លាយទៅជារោគ TB សកម្ម នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលមានរោគ HIV។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ TB មិនទាន់ចេញមុខ ព្រមទាំងរោគ HIV លោកអ្នកអាចទទួលការព្យាបាលបាន។

#### ហេតុអ្វីបានជាការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើតេស្តរកមើលរោគ HIV ប្រសិនបើខ្ញុំមានរោគ TB សកម្ម?

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ TB សកម្ម នេះគឺជាការសំខាន់ដែលត្រូវរកឱ្យបានដឹងថាតើលោកអ្នកមានរោគ HIV ដែរឬទេ ដោយព្រោះថាជួនកាលមនុស្សដែលមានរោគ TB សកម្ម គឺជាមនុស្សដែលមានរោគ HIV ផងដែរ។ នេះគឺជាការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើតេស្តដោយព្រោះថាប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ HIV ព្រមទាំងរោគ TB សកម្ម ផងដែរនោះ លោកអ្នកអាចទទួលការព្យាបាលបាន។

#### តើតេស្តអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវការ ដើម្បីរកមើលរោគ TB?

តេស្តទូទៅបីយ៉ាងដែលអាចធ្វើដើម្បីរកមើលរោគ TB នៅមន្ទីរពិនិត្យសួគរដ្ឋប្បវេណី។ តេស្តទាំងនេះគឺ:

- តេស្តជោះលើស្បែករកមើលរោគរបេង (TST) ដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ដែរថាជាតេស្ត Mantoux
- ការធ្វើតេស្តថតមើលស្លតដោយប្រើកាំរស្មីអិក្ស
- ការធ្វើតេស្តកំហាក (ខាកស្តោះ)។

តេស្តទាំងនេះអាចរកឃើញរោគ ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្លាប់បានរងការប៉ះពាល់ដោយរោគ TB ពីអតីតកាល (រោគ TB មិនទាន់ចេញមុខ) ឬប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគ TB សកម្ម។ ការសម្រេចថាតើតេស្តណាមួយដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើ គឺត្រូវសម្រេចដោយមន្ទីរពិនិត្យសួគ។

#### តើតេស្តអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីរកមើលរោគ HIV?

តេស្តឈាមដើម្បីរកមើលរោគ HIV អាចធ្វើបាននៅមន្ទីរពិនិត្យសុខភាពផ្នែកផ្លូវភេទណាមួយ នៅរដ្ឋប្បវេណី ឬនៅកន្លែងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។

#### តើអស់ថ្លៃប៉ុន្មាន?

គ្រប់តេស្តសំរាប់រោគ TB ទាំងអស់ ដែលធ្វើនៅមន្ទីរពិនិត្យសួគរដ្ឋប្បវេណី **ឥតគិតថ្លៃទេ**។ លោកអ្នកប្រហែលជាត្រូវធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទៅមន្ទីរពិនិត្យសួគ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកពុំចាំបាច់ត្រូវការមានប័ណ្ណមេឌីវែរឡើយ។ ការធ្វើតេស្ត HIV នៅមន្ទីរពិនិត្យសុខភាពផ្នែកផ្លូវភេទ នៅរដ្ឋប្បវេណី **ឥតគិតថ្លៃទេ** ហើយលោកអ្នកពុំចាំបាច់ត្រូវការមានប័ណ្ណមេឌីវែរឡើយ។ ការធ្វើតេស្តនេះក៏មាននៅកន្លែងវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំតំបន់របស់លោកអ្នកដែរ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវការមានប័ណ្ណមេឌីវែរ។

### ផ្នែកទី៤: រោគ TB និង HIV - ការព្យាបាល

#### ការព្យាបាលរោគ TB

រោគ TB សកម្មអាចព្យាបាល និងមើលឱ្យជាបានចំពោះមនុស្សដែលមានរោគ HIV។ រោគ TB សកម្ម ត្រូវគេព្យាបាលដោយប្រើការរួមផ្សំនៃថ្នាំផ្សេងៗសំរាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច៦ខែ។ គិលានុប្បដ្ឋាកតាមមើលលោកអ្នកនៅពេលប្រើថ្នាំព្យាបាលរោគ TB ដើម្បីឆែកមើលឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ណាមួយ និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាការព្យាបាលត្រូវបានបំពេញ។

រោគ TB មិនទាន់ចេញមុខ ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានរោគ HIV ដែរនោះ ត្រូវបានព្យាបាលដោយថ្នាំផ្សេងៗសំរាប់រយៈពេល៦ខែដើម្បីការពារការរីកដុះដាលនៃរោគ TB សកម្ម។

**ការព្យាបាលរោគ HIV**

ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ពុំមានថ្នាំសំរាប់ព្យាបាលរោគ HIV និងជម្ងឺ AIDS ឲ្យជាឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ថ្នាំព្យាបាលជាច្រើន ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរោគ HIV ហើយកាត់បន្ថយល្បឿននៃការខូចខាតប្រព័ន្ធការពាររោគដែលបណ្តាលដោយសារ រោគ HIV។ ដោយសារការព្យាបាល មនុស្សជាច្រើនដែលមានរោគ HIV អាចស្រួលខ្លួន និងបន្តរស់នៅដោយសុខភាពល្អ ជីវិត មានការមមាញឹក ហើយបានបំពេញតាមបំណង។

**តើអស់ថ្លៃប៉ុន្មាន?**

គ្រប់ទាំងការព្យាបាលរោគ TB **ឥតគិតថ្លៃទេ**។ ពុំចាំបាច់ត្រូវការមានប័ណ្ណមេឌីយែរឡើយ។ ការព្យាបាលរោគ HIV គឺមានសំរាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានប័ណ្ណមេឌីយែរ ដោយបង់ថ្លៃបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។

**ផ្នែកទី៥: ព័ត៌មានឯទៀត**

**តើការមានរោគ HIV ឬរោគ TB នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្ញុំដែរឬទេ?**

**រោគ TB:**

ការមានរោគ TB មិនទាន់ចេញមុខ ឬរោគ TB សកម្ម នឹងពុំមានប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកអ្នកនៅក្នុង ប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើយ។

**រោគ HIV:**

ប្រសិនបើលោកអ្នកជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ ការមានរោគ HIV នឹងពុំប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកអ្នកទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី អ្នកសុំរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ បានតម្រូវឲ្យបំពេញតម្រូវការផ្នែកសុខភាពដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វើតេស្តរោគ HIV និងការថតមើលស្ទួតដោយប្រើកាំរស្មីអិក្ស។ ច្បាប់ និងបទបញ្ជាអំពីការក្លាយទៅជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ មានភាពស្មុគស្មាញ។ ដោយហេតុនេះ គឺជាការសំខាន់ដែលត្រូវទទួលបានឱវាទផ្នែកច្បាប់ ពីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានតុណ្ណសម្បត្តិ។

**ការសម្ងាត់**

ការសម្ងាត់មានន័យថា ព័ត៌មានណាមួយដែលកិច្ចប្រជុំផ្នែកសុខភាពមានអំពីលោកអ្នក គឺជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ហើយគេមិនអាចផ្តល់ ព័ត៌មាននោះទៅឲ្យមនុស្សដទៃទៀត ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីលោកអ្នកឡើយ។ នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី នេះគឺជាការខុសច្បាប់ដែល ភ្នាក់ងារមើលថែសុខភាពណាម្នាក់ ពិភាក្សាអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ជាមួយអ្នកដទៃទៀត។

**ការប្រើប្រាស់អ្នកបកប្រែភាសា**

លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់អ្នកបកប្រែភាសា ពេលណាលោកអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយភ្នាក់ងារមើលថែសុខភាព ឬកិច្ចប្រជុំដទៃទៀត។ ក៏ដូចជាភ្នាក់ងារមើលថែសុខភាពទាំងអស់ដែរ អ្នកបកប្រែត្រូវការការរៀនសូត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។

ដោយសារការប្រើប្រាស់អ្នកបកប្រែភាសា លោកអ្នកអាច:

- យល់គ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលគេបាននិយាយប្រាប់លោកអ្នក
- ប្រាកដច្បាស់ថាគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលលោកអ្នកនិយាយ នឹងត្រូវបានគេយល់
- សួរសំណួរ ហើយទទួលបានចម្លើយ
- អាចយល់ដឹង ហើយយល់ព្រមធ្វើតេស្ត ឬទទួលការព្យាបាល។

អ្នកបកប្រែភាសាតាមទូរស័ព្ទ (TIS) ក៏មានផ្តល់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរ។ សូមទូរស័ព្ទលេខ 131 450 (ដោយបង់ថ្លៃដូចនៅក្នុងតំបន់) ហើយលោកអ្នកនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកិច្ចបម្រើដែលលោកអ្នកចង់និយាយជាមួយ និងអ្នកបកប្រែភាសាតាមទូរស័ព្ទ។

**កិច្ចបម្រើទាំងឡាយដែលអាចជួយ:**

**មន្ទីរពិនិត្យសួរ**

ចំពោះមន្ទីរពិនិត្យសួរដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ សូមបើកមើលរូបសាយ:

[www.health.nsw.gov.au/publichealth/infectious/tb/pdf/chest\\_clinics/pdf](http://www.health.nsw.gov.au/publichealth/infectious/tb/pdf/chest_clinics/pdf)

**មន្ទីរពិនិត្យសុខភាពផ្នែកផ្លូវភេទ**

ចំពោះមន្ទីរពិនិត្យសុខភាពផ្នែកផ្លូវភេទដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ សូមរកមើលក្រោមតួអក្សរ 'S' ក្នុងសៀវភៅលេខទូរស័ព្ទទំព័រស ឬទូរស័ព្ទទៅបណ្តាញផ្តល់ព័ត៌មានផ្នែកសុខភាពផ្លូវភេទលេខ 1800 451 624។

**ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពី HIV ជាភាសារបស់លោកអ្នក សូមបើកមើលរូបសាយ:**

កិច្ចបម្រើផ្នែករោគ HIV/AIDS និងជម្ងឺរលាកថ្លើមជំពូក C ពហុវប្បធម៌

Multicultural HIV/AIDS and Hepatitis C Service [www.multiculturalhivhepc.net.au](http://www.multiculturalhivhepc.net.au)

**ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីរោគ TB ជាភាសារបស់លោកអ្នក សូមបើកមើលរូបសាយ:**

កិច្ចបម្រើផ្នែកទំនាក់ទំនងសុខភាពពហុវប្បធម៌

Multicultural Health Communication Service [www.mhcs.nsw.gov.au](http://www.mhcs.nsw.gov.au)

**ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋញូវសៅវែល**

[www.health.nsw.gov.au/PublicHealth/Infectious/TB/index.asp](http://www.health.nsw.gov.au/PublicHealth/Infectious/TB/index.asp)