

សេចក្តីណែនាំសំរាប់ការយកកំហាកដើម្បីពិនិត្យមើលរលេង (TB) Instructions for Collecting Sputum for Tuberculosis (TB)

មានការស្នើសុំឲ្យលោកអ្នកយកកំហាក(ស្នេស្ត)នៅពេលព្រឹកព្រលឹម ៣ ដង។ ដើម្បីជួយលោកអ្នក ក្នុងការយកកំហាកទាំងនេះ យើងខ្ញុំបានផ្តល់ឲ្យលោកអ្នកនូវកូនកែវ៣ សំរាប់ដាក់កំហាក និងថង់ប្លាស្ទិកមួយ។ កែវទាំងនោះមាន ផ្នែកដែលមានឈ្មោះរបស់លោកអ្នក ហើយមានបិទលេខ "1", លេខ "2" និងលេខ "3" សំរាប់ពេល ៣ ថ្ងៃ ដាច់ៗគ្នា។ **សូមប្រុងប្រយ័ត្ន កុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ផ្នែកខាងក្នុងកែវឲ្យសោះ។**

កំណត់ចំណាំ: ជាការសំខាន់ចាំបាច់ដែលលោកអ្នកផ្តល់កំហាក/ស្នេស្ត ចេញពីសួតរបស់លោកអ្នក ពោលគឺមិនមែនទឹកមាត់ (រត្តធាតុរាវនៅក្នុងមាត់) ទេ សំរាប់ការធ្វើតេស្ត។

បើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការបញ្ចេញកំហាក សូមបើកក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក រហូតទាល់តែបន្ទប់ទឹកមួយទៀតចំហាយ។ (សូមប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានទឹកក្តៅហូរហៀររលាក)។ សូមបិទទ្វារ ហើយអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់មានចំហាយនេះ ពី៥ ទៅ១០ នាទី ហើយសាកល្បងធ្វើម្តងទៀត។ បើមិនដូច្នោះទេ លោកអ្នកអាចសាកល្បងដូតទឹកផ្កាឈូក ឬក៏ទឹកក្នុងអាងក្តៅខ្លះៗ មុននឹងយកកំហាក។ សូមដកដង្ហើមឲ្យបានខ្លាំងៗ ដោយសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើចំហៀងដើមទ្រូងទាំងសងខាងរបស់លោកអ្នកព្រមគ្នា ហើយការប្រឹងក្អកយ៉ាងខ្លាំងអាចជួយបញ្ចេញនូវកំហាក។

ការណែនាំ:

១. នៅពេលដែលលោកអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេកនៅពេលព្រឹក និង **មុនពេលដែលលោកអ្នកទទួលបានទឹក ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀត ឬក៏សំអាតម្រាម** សូមយកកំហាកដាក់ទៅក្នុងកែវដែលមានផ្នែកលេខ "1" សិន ។ (សូមអែកមើលឲ្យច្បាស់ថា លោកអ្នកមិនមែនស្មោះចេញមកតែទឹកមាត់នោះទេ)។
២. សូមសរសេរថ្ងៃខែនិងម៉ោងលើកែវដែលមានផ្នែកលេខ "1" ស្តីអំពីការដាក់កំហាកនេះទៅក្នុងកែវនោះ។
៣. **សូមមូលបិទគម្របកែវឲ្យបានដាច់ល្អ ដើម្បីចៀសវាងកុំឲ្យមានការកំពប់ហូរចេញ។**
៤. សូមដាក់កែវនោះទៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកដែលផ្តល់ជូនស្រាប់នោះ។
៥. សូមដាក់ថង់ប្លាស្ទិកដែលមានកែវនោះ ទៅក្នុងទូទឹកកក **មិនមែនទូក្តៅសេទេ។**
៦. សូមធ្វើតាមវិធានការណែនាំពីលេខ ១ ទៅដល់លេខ ៥ សំរាប់ ព្រឹកទី ២ និងព្រឹកទី ៣ ជាបន្តបន្ទាប់ ដោយប្រើកែវ (ដែលមានផ្នែកលេខ "2" និង "3")។
៧. សូមប្រគល់កែវដាក់កំហាកទាំងនោះ ទៅមន្ទីរពិនិត្យសួត/រលេង ឬក៏នាយកដ្ឋានពិសោធន៍មើលរោគ (កន្លែងណាមួយដែលគេណែនាំឲ្យយកទៅ) **ឲ្យបានឆាប់ទៅតាមលទ្ធភាព** ក្រោយពីបានយកកំហាក ចុងក្រោយរួច។ សូមទុកដាក់កំហាកទាំងនោះ នៅក្នុងកន្លែងត្រជាក់ ហើយកុំឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃ

របៀបដល់ពេលយកទៅមន្ទីរពេទ្យ។

កំណត់ចំណាំ: គេអាចត្រូវការពេលដល់ទៅ ៣ ថ្ងៃ ជាថ្ងៃធ្វើការ ដើម្បីទាញយកលទ្ធផលដំបូង ហើយចំពោះ
លទ្ធផលបណ្តុះបណ្តុះក្រោយអាចត្រូវការពេលពី ៦ ទៅ ៨ អាទិត្យ។ គិលានុបដ្ឋាកនៅមន្ទីរពិនិត្យស្មុតនឹងជំរាបឲ្យ
លោកអ្នកដឹង អំពីភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយណា។

*បើលោកអ្នកមានសំណួរអ្វីស្តីអំពីការយកកំហាកដើម្បីឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើល សូមទាក់ទងមន្ទីរពិនិត្យស្មុត
តាមទូរស័ព្ទលេខ:*

សូមអរគុណ