


Reserve a Data para Vacinar

É importante garantir que as vacinas são administradas a tempo para que os bebés estejam protegidos cedo e não corram o risco de contrair doenças graves.

Para saber quando é devida a próxima vacina do seu bebé, consulte o Calendário de Imunização de NSW na health.nsw.gov.au/vaccinate



O meu Registo Pessoal de Saúde (Livro Azul)

É importante levar o Livro Azul da sua criança a cada consulta para que as vacinas da sua criança sejam registadas pelo/a médico/a de clínica geral ou enfermeiro/a.



Mais informações

NSW Health

health.nsw.gov.au/immunisation

Departamento de Saúde do governo australiano

health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax

mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

Folha informativa sobre a Hepatite B para NSW

health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx

Registo Australiano de Imunização

servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register

NSW Health

Vacina contra a hepatite B

Para o seu Bebé Recém-nascido



Hepatite B

O vírus da hepatite B pode causar doenças crónicas do fígado tais como a cirrose e o cancro do fígado. Bebés infetados com a hepatite B têm uma chance de 90% de contrair uma infeção crónica permanente.

A hepatite B é muito infecciosa e pode ser facilmente transmitida por:

- uma mãe infetada, transmitindo-a ao seu bebé durante o parto
- uma picada com um objecto sujo, tal como uma agulha ou lâmina
- contacto directo entre o sangue de uma pessoa infetada e uma ferida aberta, por exemplo, esfoladelas e cortes
- sexo com uma pessoa infetada.

Rastreio Pré-Natal

Todas as mulheres devem fazer o rastreio da hepatite B durante os testes de rastreio pré-natal. Se o teste for positivo, o bebé necessitará tratamento para prevenir a infeção e o risco de doença crónica do fígado. Um tratamento pode também ser recomendado para a mãe.

Prevenção

A vacina contra a hepatite B é usada na Austrália desde o início dos anos 80 e a vacinação é o melhor meio de prevenir a doença.

A Vacina contra a Hepatite B para Recém-nascidos

A vacina contra a hepatite B é oferecida a todos os bebés recém-nascidos imediatamente após o parto para:

- prevenir a transmissão da doença de uma mãe infetada ao seu bebé. Por vezes a mãe pode não saber que está infetada; e
- prevenir a transmissão da doença nos primeiros meses de vida por pessoas infetadas que vivam na mesma casa ou outras pessoas que possam estar infetadas.

O Programa de Vacinação contra a Hepatite B

Recomenda-se que seja administrada uma dose da vacina contra a hepatite B ao seu bebé imediatamente após o parto ou durante os primeiros 7 dias de vida, seguida de três outras doses da vacina contra a hepatite B às 6 semanas, aos 4 meses e aos 6 meses de idade.

A Segurança da Vacina contra a Hepatite B

Vasta experiência mostra que a vacina contra a hepatite B é segura e bem tolerada por bebés recém-nascidos. Os efeitos secundários mais comuns da vacina são ligeiros e incluem vermelhidão e inchaço no local da injeção. A vacina contra a hepatite B não interfere com o aleitamento materno.

Tratamento de Bebés Nascidos de Mães Infetadas com a Hepatite B

Além de uma dose da vacina contra a hepatite B ser oferecida imediatamente após o parto, um tratamento chamado 'imunoglobulina anti-hepatite B' será também oferecido a um bebé nascido de uma mãe infetada com a hepatite B dentro de 12 horas após o parto, de modo a fornecer protecção adicional. É essencial que o programa completo da vacina contra a hepatite B seja também completado para protecção a longo prazo.

Testes Suplementares para Bebés Nascidos de Mães Infetadas com a Hepatite B

Um bebé nascido de uma mãe infetada com a hepatite B necessita fazer uma análise de sangue 3 meses após ter completado o programa de vacinação contra a hepatite B para verificar se está protegido. A NSW Health enviará uma carta de advertência a si e ao seu médico.

