

لقاحات الطفولة

السن	المرض	اللقاح	معلومات
سن الولادة	التهاب الكبد ب	H-B-VAX II أو ENGERIX B (IM)	في غضون 7 أيام من الولادة (والأفضل في الحالات المثالية خلال 24 ساعة)
6 أسابيع	الدفتيريا (الخناق)، التيتانوس (الكزاز)، السعال الديكي، المستدمية النزلية من النوع ب، التهاب الكبد ب، شلل الأطفال	(IM) INFANRIX HEXA	ROTARIX: الجرعة 1 فقط للبالغين 6 أسابيع إلى 14 أسبوعاً من العمر
	المكورات الرئوية فيروس الروتا	(IM) PREVENAR 13 ROTARIX (عن طريق الفم) (IM) BEXSERO	BEXSERO: يوصى باستخدام الباراسيتامول الوقائي. يتوفر كلقاح استلحافي للأطفال السكان الأصليين >2 حتى 30/06/2023
4 أشهر	الدفتيريا (الخناق)، التيتانوس (الكزاز)، السعال الديكي، المستدمية النزلية من النوع ب، التهاب الكبد ب، شلل الأطفال	(IM) INFANRIX HEXA	ROTARIX: الجرعة 2 فقط للبالغين 10 أسابيع إلى 24 أسبوعاً
	المكورات الرئوية فيروس الروتا	(IM) PREVENAR 13 ROTARIX (عن طريق الفم) (IM) BEXSERO	BEXSERO: يوصى باستخدام الباراسيتامول الوقائي. يتوفر كلقاح استلحافي للأطفال السكان الأصليين >2 حتى 30/06/2023
6 أشهر	الدفتيريا (الخناق)، التيتانوس (الكزاز)، السعال الديكي، المستدمية النزلية من النوع ب، التهاب الكبد ب، شلل الأطفال	(IM) INFANRIX HEXA	يُنصح بإعطاء الأطفال البالغين <6 أشهر الذين لديهم حالات يرتفع فيها خطر إصابتهم ب-IPD؛ جرعة إضافية من PREVENAR 13 - راجع AIH*
	المكورات السحائية ب (السكان الأصليين فقط)	(IM) BEXSERO	قد يحتاج أطفال السكان الأصليين للبالغين <6 أشهر الذين لديهم حالات يرتفع فيها خطر الإصابة إلى جرعة إضافية من Bexsero - راجع AIH*
12 شهراً	المكورات السحائية ACWY المكورات الرئوية الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية	(IM) NIMENRIX (IM) PREVENAR 13 PRIORIX أو MMR II (IM أو SC)	BEXSERO: يوصى باستخدام الباراسيتامول الوقائي. يتوفر كلقاح استلحافي للأطفال السكان الأصليين >2 حتى 30/06/2023
	المكورات السحائية ب (السكان الأصليين فقط)	(IM) BEXSERO	
18 شهراً	الدفتيريا (الخناق)، والتيتانوس (الكزاز)، والسعال الديكي	أو INFANRIX (IM) TRIPACEL	
	الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، والحماق	أو PRIORIX TETRA (IM أو SC) PROQUAD (IM أو SC) ACT-HIB	
4 سنوات	المستدمية النزلية من النوع ب الدفتيريا (الخناق)، التيتانوس (الكزاز) والسعال الديكي، وشلل الأطفال	أو INFANRIX-IPV (IM) QUADRACEL	يُنصح إعطاء الأطفال الذين لديهم حالات يرتفع فيها خطر الإصابة ب-IPD؛ جرعة إضافية من PNEUMOVAX 23 - راجع AIH*

المجموعات المعرضة والمراهقون والبالغون المعرضون لخطر الإصابة

السن/الحالة	المرض	اللقاح	معلومات
جميع الأشخاص الذين يعانون من عدم وجود/صغر الطحال وضعف وظيفة الطحال ونقص المكملات والعلاج باستخدام عقار eculizumab	المكورات السحائية ACWY	(IM) NIMENRIX	راجع AIH* لمعرفة الجرعات المطلوبة ومواعيدها يوصى بأن تتلقى مجموعات إضافية هذه اللقاحات ولكنها غير ممولة
	المكورات السحائية ب	(IM) BEXSERO	
<5 سنوات مع عدم وجود/صغر الطحال أو ضعف وظيفة الطحال	المستدمية النزلية من النوع ب	(IM أو SC) ACT-HIB	إذا تم التلقيح بشكل غير كامل أو لم يتم التلقيح في مرحلة الطفولة
صف السنة 7	الدفتيريا (الخناق)، والتيتانوس (الكزاز)، والسعال الديكي	(IM) BOOSTRIX	
	فيروس الورم الحليمي البشري	(IM) GARDASIL 9	
صف السنة 10	المكورات السحائية ACWY	(IM) NIMENRIX	
	الإنفلونزا الشاهوق	INFLUENZA أو BOOSTRIX (IM) ADACEL	الإنفلونزا: أي ثلث من مدة الحمل الشاهوق: في كل حمل ما بين 20-32 أسبوعاً
السكان الأصليين <50 سنة	المكورات الرئوية	(IM) PREVENAR 13 (IM) PNEUMOVAX 23	Prevenar 13: <50 سنة Pneumovax 23: شهران-12 شهراً بعد ذلك Pneumovax 23: بعد 5 سنوات على الأقل
70 سنة	المكورات الرئوية زوستر	(IM) PREVENAR 13 (SC) ZOSTAVAX	المكورات الرئوية ممولة للأشخاص <70 زوستر: يتوفر لقاح استلحافي لمن تتراوح أعمارهم بين 71 و 79 سنة حتى 31/10/2021

الأشخاص المعرضون لحالات يرتفع فيها خطر الإصابة ب-IPD؛ راجع AIH* على الإنترنت لمعرفة الحالات الموصى فيها لتلقي PREVENAR 13 و PNEUMOVAX 23

الإنفلونزا

السن/في حالة ارتفاع خطر الإصابة	توصية	معلومات
جميع الأطفال من سن 6 أشهر إلى >5 سنوات	السكان الأصليين <6 أشهر	للإشارة على العلامات التجارية للقاحات والأهلية، راجع: www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/flu.aspx
الأشخاص الذين يعانون من حالات يرتفع فيها خطر الإصابة <6 أشهر	السكان الأصليين <65 سنة	التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا
النساء الحوامل		